安顺市
中医、民間医、民族医
祕方験方
第一集

安順市卫生科

1959.9.30

VISIT…

LANZAROTE Caliente.com

前　言

自我市掀起献方高潮以来，我們先后收到了秘驗方三千一百六十个，其中有数代珍藏的手抄秘本和祖傳秘方，这是我市中医、民間医、民族医在党的英明領导下，提高社会主义覺悟的具体表現。为了让这些从实际經驗中积累而来的有效方剂，能发揮它为人民保健事业服务的巨大作用，我們尽量抽出时間来整理，初步选出秘驗方七百五十六个，作为第一集出版，其余的准备留待出版第二集时，再为选印。

在59年大跃进的基础上，我市人民和全国人民一样，正在开展一个反右傾、鼓干勁、学先进、赶先进的轰轰烈烈的运动，我們的秘驗方集，恰在这个时期出版，这是我們响应党的号召爭取完成59年跃进計划的初步表現，也是向国庆十周年的献礼。

由于我們的学識有限和时間迫促，漏誤和不够完善之处，在所难免，希望各界特別是医药界的同志們多多給以批評和指正，幷継續献出更多的宝貴的秘驗方来，以备我們下一次整理时有所遵循。这是我們最真誠的一点期待。

最后希望应用这些秘驗方时，要結合辨症論治的原則，免致有誤。

安順市衛生科

1959年9月30日

第一集目录

内　科（280方）

1、风温感冒……………11方……………（1）
2、中风……………5方……………（3）
3、癫痫……………4方……………（4）
4、头痛、眩、晕……………5方……………（5）
5、咳嗽、哮喘……………12方……………（6）
6、血症（咳、吐、衄、便尿）38方……………（8）
7、汗症……………6方……………（14）
8、虚劳……………4方……………（15）
9、黄疸……………2方……………（16）
10、肿胀……………17方……………（17）
11、心胃痛……………15方……………（20）
12、胸胁痛……………6方……………（22）
13、腹痛……………8方……………（24）
14、吐泻……………15方……………（25）
15、疟疾……………16方……………（28）
16、痢疾……………13方……………（30）
17、风湿痈痹痿……………21方……………（33）
18、前阴……………12方……………（38）
19、小便……………9方……………（40）
20、遗精……………7方……………（41）
21、五淋……………19方……………（43）

22、疝气……………………20方……………………(46)
23、麻风…………………… 5方……………………(49)
24、杂症……………………10方……………………(50)

妇　科（90方）

1、妇经……………………16方……………………(55)
2、种子…………………… 3方……………………(57)
3、崩带…………………… 6方……………………(58)
4、胎产……………………23方……………………(59)
5、乳疾……………………27方……………………(60)
6、杂病……………………16方……………………(66)

儿　科（87方）

1、麻疹……………………11方……………………(69)
2、惊痫……………………19方……………………(70)
3、百日咳…………………… 4方……………………(75)
4、喘咳…………………… 6方……………………(75)
5、疳积…………………… 8方……………………(77)
6、泻痢……………………12方……………………(78)
7、脱肛…………………… 3方……………………(80)
8、虫症…………………… 6方……………………(81)
9、杂病……………………18方……………………(81)

外　科（210方）

1、刀伤……………………34方……………………(87)
2、跌打损伤……………………29方……………………(92)
3、骨折……………………15方……………………(97)

4、痈疽……………… 9方……………………(99)
5、疮类………………40方……………………(101)
6、瘰疬………………10方……………………(108)
7、梅毒………………22方……………………(110)
8、痔、脱肛…………22方……………………(114)
9、汤火……………… 6方……………………(117)
10、犬、蛇、虫伤……12方……………………(118)
11、外杂………………11方……………………(120)

五 官 科（89方）

1、眼类………………16方……………………(123)
2、鼻类……………… 7方……………………(125)
3、耳类………………23方……………………(126)
4、口疮………………13方……………………(129)
5、牙类………………10方……………………(131)
6、咽喉………………20方……………………(133)

內 科

（风温、感冒）

1、方名：加减銀翹散　　　　　　　　楊紹昱

主治：流行性感冒　风温　咳嗽　发热等症

方葯：銀花　連翹　大力子　桔梗　淡豆豉　杏仁　苏荷　荆芥　葦根

用法：共研細末，每包四錢，分三次服完。

附註：加味治幷病經驗介紹：背痛骨疼用葛根；鼻流血用白茅根；喉痛用山豆根、馬勃；头疼面赤用石菖蒲；下泻津亏用泡参；下血痢用茜草；腹痛利不止用粟壳；嘔吐用青木香；肺热面紅用霜桑叶。以上均用水煎吞服前散。

2、方名：錢乙泻青丸（借用）　　　　　　吳繼歧

主治：流行性感冒、风温外寒內热、便秘等症。

方葯：龙胆草　黑山梔　酒庄黄　川芎　当归　羌活　防风

制法：上葯各一两研末炼蜜为丸，如豆大。

服法：小儿每服一至二粒，成人六至九粒，清茶吞服，一日三次。

3、方名：加味小柴胡湯　　　　　　李世凱

主治：寒热往来　出汗（七日以上）舌振顫　不思食

方葯：柴胡三錢　黄芩三錢　人参一錢半　茯苓三錢　制半夏三錢　生姜三片　大枣三枚　甘草二錢　水煎服。

4、方名：輕疎清解法　　　　　　　顧仲培

主治：风温初起　恶寒发热　头痛身疼　咳嗽　喘促

眩暈　目脹等症

方葯：連翹二錢　霜桑叶三錢　半夏一錢五分　苦杏仁(去皮尖)三錢　薄荷一錢　陈皮一錢　苦桔梗七分　通草一錢　冬桑皮二錢　竹叶一錢

用法：水煎服。

禁忌：油、糖、辛、燥等物。

5、方名：滋阴清气法　　顧仲培

方葯：連翹一錢半　小生地三錢　竹叶錢半　生苡仁三錢　通草一錢　桑叶三錢　麦冬二錢　川貝(去心)二錢

用法：水煎服。

6、方名：清营泄热法　　顧仲培

方葯：大生地四至八錢　犀角一錢　通草一錢　川貝二錢　玄参三錢　地骨皮二錢　麦冬三錢　羚羊角一錢　竹叶一錢半

用法：水煎服。

附註：随症加味用葯。如咽喉肿痛，原方加牛蒡子、黄芩各二錢、射干二錢。如发痧疹者加赤芍二錢、玄参三錢、牛蒡子二錢。如大热大渴舌紫唇焦者，加石羔四錢。

7、方名：斑疹伤寒驗方　　李柏銘

症状：体温41°C稽留不退、发热、咳嗽剧烈、腸鳴、小便閉、大便不正常、唇干舌裂、神昏气喘、上呼吸道症状显著，經过青霉素鏈霉素治疗无效。

方葯：連翹　銀花　桔梗　前胡　枳壳　川連　知母　石羔　榔片　寸冬　生地　雄黄　甘草　淡竹叶

用法：水煎服。

感　　冒

8、主治：感冒

方葯：紫苏叶三錢　香附三錢(姜斗炒)　炒蒼耳子三錢　炙甘草一錢　淡豆豉五錢　生姜三錢

用法：水煎服。

9、方葯：(兼头痛)羌活四錢　独活三錢　蒼朮三錢　川芎三錢　广皮三錢　京下四錢　炙甘草一錢半　生姜三錢

用法：水煎服。

10、方葯：(头痛身疼)羌活四錢　防风三錢　蒼朮三錢　川芎三錢　桂枝三錢　云苓四錢　陈皮三錢　白芷三錢　炙草一錢半

用法：水煎服。

11、方葯：(头痛身疼項强胸紧)麻黃三錢半　桂枝三錢　芍葯三錢　杏仁十五粒(去皮尖)甘草三錢　生姜三錢　紅枣四枚

用法：水煎服。

禁忌：油、生、冷、酸、米湯、稀飯。

(以上四方范机承献)

(中风)

1、方名：預防中风方　　　邓德光

主治：凡老年人气体衰弱，中指麻木，三年內必有中风之患，可常服下方：

方葯：黃芪五錢　抗芍三錢　桂枝三錢　独活三錢　防风三錢　生姜四錢　大枣五个

用法：水煎溫服。

禁忌：生冷。

2、主治：风閉証，牙关紧急，两手握固。　　王平州

方葯：茄梗（在秋月风干）

用法：将上葯于房內焚之（房勿透风），外用老陈茶叶煎水服特效。

3、方名：中风內服方　　陈德俊

方葯：半夏茯苓各三錢　陈皮炙草各一錢半　淡竹叶廿片　姜汁二湯匙

用法：水煎服。厚被取汗，連服二剂。

4、方名：中风外用方　　陈德俊

方葯：牛黄一分　麝香五厘　生葱一束

用法：先将牛黄麝香研和，放肚臍上，再用葱搗烂盖上，以熨斗熨之。

5、方名：天蔴定风湯　　（洪氏本）楊紹昰献

主治：中风偏左偏右

方葯：天蔴八錢　蒼耳　蟬蛻　彊蚕　蔓京　菟絲　生地各二錢　甘草一錢　用牛条根为引

服法：水煎服。

（癲痫）

1、方名：遂心丸　　李中品

主治：失志癲狂

方葯：豬心血炒甘遂为丸（如胃脘痛加玉金　薄荷　枯矾）

用法：沸水吞服。

2、方名：加味七气湯　　邱志明

主治：癲症因气郁而成者

方葯：茯苓三錢　厚朴三錢　半夏三錢　白朮三錢　苏叶三錢　生姜三錢　大枣六个　蒼朮三錢　香附

三錢　广木香三錢

用法：水煎服。

禁忌：生冷。

3、方名：加味温胆湯　　　　邱志明

主治：癲症治愈后，用此以杜再发。

方葯：半夏三錢　茯苓三錢　陈皮二錢　炙草二錢　生姜三錢　大枣三个　枳实三錢　竹茹三錢　当归三錢　烏梅肉三錢　桂枝三錢　川椒二錢

用法：水煎服。

4、主治：痴呆（有痰火者）　　　　蔣远謀

方葯：礞石滚痰丸四两

用法：日服三錢，飯后服。

禁忌：豆浆。虚症不宜用。

附註：服后吐痰容易，便时有痰。

（头痛、眩暈）

1、方名：加减清震湯　　　　楊紹昱

主治：头乍痛乍止　面时潮热　欲嘔不嘔　脉細滑而数超魚际

方葯：蒼朮三錢　升麻三錢　大荷叶一張　銀花四錢

用法：水煎服。

禁忌：酒及辛辣。

2、方名：治郁热冲脑方　　　　楊紹昱

主治：头热面赤　脉大便結

方葯：川芎五分　大黃三錢　荷叶一張　石蒲一錢五分

用法：水煎，飯后稷服。

禁忌：虚症不宜用，禁酒。

3、方名：治偏头风方（外用）　　楊巨源

方葯：万年青根(去皮搗烂)

用法：将上葯塞鼻，左痛塞右、右痛塞左。

4、主治：偏正头风　　支竹舫

方葯：川芎七錢　天麻三錢　雨前茶一錢

用法：将上葯用米酒一碗，煎六分去渣，再煎取五分晚服。

5、主治：头暈目眩　　支竹舫

方葯：豬脑一个

制法：用清开水洗去血，加水煎三十分鈡。

用法：将豬脑連湯服下，每日服一个，服七日为一疗程。

（咳嗽、哮喘）

1、方名：治咳喘方　　楊紹昱

方葯：杏仁　核桃仁　等分搗泥加蜜为丸

用法：日三服，开水下。

2、主治：咳嗽痰少，低热气喘。　　李世凱

方葯：麦冬三錢　天冬三錢　制半夏三錢　洋参一錢半　桔梗三錢　陈皮三錢　尖貝三錢　粳米六錢　生姜三片　大枣三枚

用法：水煎服。

3、主治：干咳　　支竹舫

方葯：生落花生（去壳搗碎）每用一两

用法：煎湯服，疗效极好。

4、主治：哮喘（水臌）兼感冒发热者　　黄昇阳

方葯：麻黄（去根节）二錢五分　甘草二錢　白果五枚（搗碎）

用法：将上药水煎取汁約一碗，早晚各服一次，每日一剂，約两三剂即愈。（成人量）

5、又方：治哮喘　　　　　　　　　　　　　黄昇阳

方药：生螃蟹炕干为末　麻黄一錢　白糖一两

用法：先用麻黄煨好去沫取汁，加白糖水吞服螃蟹末。

6、方名：獭肝散　　　　　　　　　　　　　李中品

主治：肺劳咳嗽，終夜不眠。

方药：獭肝一付（炙干）

用法：将上药用开水吞服，日服三次。

7、主治：虚寒咳嗽　　　　　　　　　　　　潘炳先

方药：当归二錢　黄芪三錢　云苓三錢　白朮三錢　熟地三錢　北杞三錢　附片二錢　均姜二錢　肉桂二錢　潞参二錢　甘草二錢　生熟姜三片　（加胡挑带壳燒存性二个）

用法：水煎服。

8、主治：咳嗽　　　　　　　　　　　　　　楊巨源

方药：生蘿卜一个（中通一孔，以数点眞麻油滴入孔內）

用法：将蘿卜放老糠火內炮熟吃。

9、主治：咳嗽成痨吐綠痰　　　　　　　　　楊巨源

方药：綠壳鴨蛋三个

用法：将鴨蛋放新发石灰（即水淋生石灰）內，俟炮熟即剝去壳吃。

10、主治：咳嗽上气　　　　　　　　　　　楊巨源

方药：核桃三个取仁　生姜三片

用法：生姜泡开水嚼核桃仁，姜水送下。

11、主治：咳嗽不止　　　　　　　　　　　楊巨源

方药：鴉蛋壳皮一两（焙干研末）麻黄三錢（研末）

用法：二味配匀、开水吞服。一日三次，每服二至三錢。

12、主治：咳嗽气弱　　　　楊巨源

方葯：一朵云一小把

用法：熬甜酒服。

血証（咳、吐、衄、便、尿）

1、主治：咳嗽吐血　　　　楊巨源

方葯：細叶苦蒿一把　冰糖适量

用法：将上葯蒸冰糖吃，有效。

2、主治：咳血　　　　支竹舫

方葯：白芨（不拘多少研末）

用法：每日服三次，飯后白开水冲服一錢。

3、主治：肺炎咳嗽吐血　　　　李正平

方葯：三七五分　黃柏皮一两　韮菜根一把　童便

用法：将三七、黃柏研为細末，用韮菜根搗烂，兌童便吞服。

用量：老年每服葯末五分，中年每服一錢，每日二次。

注意：儿童愼用。

4、主治：久咳見血　　　　張少华

方葯：一口血（晒干研末）

用法：将上葯兌甜酒汁蒸熟服下。

用量：成年人每日三次，每次一錢空腹服。

禁忌：生冷食物。

5、又方：治咳血　　　　張少华

方葯：梅花一两　冰糖四錢

用法：水煎服。

用量：成年人每日三次，空心服下，連服三日可好。

6、主治：咳嗽吐血　　周德純

方葯：宝兰花叶和梗（最好用兜）

用法：将上葯煨豬肉（鴉肉更好）多服断根不发。煨服时可酌放盐味。

附註：宝兰花如小芭蕉叶相同，但此叶稍团，无尖，色灰白，花如藕蓮花瓣，黃色。

7、方名：治吐血方　　支竹舫

方葯：白芨三錢　旱三七一錢

用法：水煎服。

8、主治：吐血不止　　楊紹昱

方葯：荆芥(連根洗淨，搗汁半盞)生地(浸取汁)

用法：二味等量和匀，同服最有效。

9、又方：治吐血　　楊紹昱

方葯：荷叶蒂（或用白茅草根或藕节均可）

用法：煎湯服。

10、主治：因举重伤肺吐血　　楊紹昱

方葯：白芨为末

用法：米湯調服，每服三錢。

11、又方：治吐血　　楊紹昱

方葯：人乳一两　童便一两　生姜汁　側柏叶汁各适量

用法：四味和匀同服。

12、主治：吐血不止　　王平洲

方葯：大当归一支(約重三四两，切細)　好陈酒一斤

用法：将葯入酒內，慢火煮至一碗，候将吐时，口中有血务須含住，取所煮葯酒一口，連血嚥下，其血必止，随将酒分数次飲完，一剂而癒，永不再发。如一时煎熬不及，可先用当归一二寸嚼烂，

带血吞下，将血暂止，再用前法服之，屡用均效。

13、主治：吐血　　王云臣

方药：馬肺　馬蹄子

用法：二味焙干为末，每服五錢，一日三次，开水吞服。

14、主治：吐血止后，清理瘀热　　王云臣

方药：散血草五錢　朝天貫一两　五甲西二分　串玲草一两　地米菜花三錢　梔仁二錢

用法：水煎服。每日三次，每次一碗。

15、主治：吐血气滿　　王云臣

方药：雪里箭一两　散血草五錢　党参五錢　朝天貫五錢　五甲西五分

用法：水煎服。一日三次，每次半碗，隔三日服一剂。

16、又方：治吐血　　王云臣

方药：党参五錢　泡参五錢　地桃子五錢　地串白根五錢　五甲西一錢　豬肉半斤

用法：上药和肉燉服。（不吃药，只吃肉和湯）

禁忌：土酒、鴉、盐。

附註：服后可能有头痛、脚軟等現象。

17、主治：鼻流血不止　　王国圣

方药：小便罐　生半夏末

用法：将小便罐放火上，使患者聞其臭气，外用生半夏末紙包塞鼻孔，血即止。

18、主治：流鼻血不止　　范机承

方药：生艾叶三錢半　生荷叶三錢半　炒黑山梔子三錢半　生扁柏茶三錢半　北柴胡三錢　黃芩三錢　炒黑大黃二錢半　生甘草三錢　大生地一两二錢

用法：水煎服。三至四次立止。

又方：治鼻血不止　　范机承

方葯：用灯火在患者大指甲側边商穴打一灯火（多則三几次）左流打左，右流打右，双流双打，卽止。

19、方名：治血証方　　范机承

主治：吐、咯、唾、衄，諸般血証

方葯：眞犀角末一分　分成三包　大生地一两五錢　荆芥穗(炒黑)五分

用法：将后二味用水煎，每用犀角末一包，放舌上，卽用煎好葯汁呑服，每两点半鈡服一次。

20、又方：治血証　　范机承

方葯：山梔子(炒黑)四錢　条芩三錢半　綿錦紋（燒存性)三錢　荆芥穗(炒黑)五錢

用法：上葯共煨服三次，子午时服下。

21、又方：大生地二两五錢　生山梔打四錢　条芩三錢半　蓮子肉（不去心皮）八錢　荆芥穗炒黑七錢　生甘草三錢　　范机承

用法：上葯共煨服四次，子午时服。

22、又方：生牡蠣(打)五錢　生龙骨(打)五錢　生赤白芍各二錢半　代赭石(打)五錢　生山梔(打)三錢　綿錦紋(燒存性)三錢　荆芥穗(炒黑)六錢　生甘草三錢

用法：上葯共煨服四次，不拘时服，每日二次。

23、主治：血止后，服此方二至三剂养血，以复健康。

范机承

方葯：秦当归（川归不宜）五錢　大生地一两五錢　大麦冬七錢　广百合七錢　抗白芍三錢　浙白朮五錢　蓮子肉（不去心）一两　白云苓四錢　北柴

胡二錢　抗菊花三錢　生甘草三錢

用法：上葯共煨服五次，每日早晚各服一次。

禁忌：以上各方，忌用煤火煨葯（柴炭火为佳）并禁食鴉、魚、油、酒及辛辣等物。

附註：如有血块須于各方內加童便和服三次。

24、主治：肺痈吐膿血　　　　范机承

方葯：山羊肺(切)　生山羊血　白芨粉

用法：將肺煮熟，以羊血和白芨粉攪和，每日子午时將肺蘸食，每服二两左右，多則三月，病卽痊癒。

禁忌：切勿間断，癒后忌食姜、酒、鴉、牛、馬肉，辣子一百天。

25、主治：鼻血

方葯：生地　山梔仁炒各五錢

服法：水煎服。

主治：鼻血不止

方葯：胎发燒灰成性　炒黃梔肉七个

制法：上二味研末，收貯瓶內，挑入鼻孔，其血卽止。

（以上二方系郑氏本、郑盛文献）

便　血

26、主治：腸风下血

方葯：黃苓　黃柏　木通　豬苓　赤芍　甘草各一錢　黃連八分　泽泻六分　槐角二錢

服法：水煎服。

又方：

27、方葯：臭椿树根　火酒

服法：將上葯搗烂熬酒服。

又方：（兼有痔者）

28、方薬：猫骨煅灰　油

用法：将骨灰調麻油抹患处。

禁忌：魚、虾等发物。

（以上三方系郑氏本、郑盛文献）

29、主治：大腸下血　楊巨源

方薬：地瓜根　豬血

用法：水煎服。

30、主治：腸风下血　顧仲培

方薬：全归五錢　荆芥(炒)三錢

用法：水煎服。輕者一剂，重者三剂即癒。

31、方名：腐泥黑　聶华彬

主治：大腸下血，无論远年近患，經过各种医治无效者，連服此方一星期即痊癒，永不再发，神效无比。

方薬：豆腐四两　紅沙糖一两多

用法：二味共同下鍋搭散炒干黃色，空心服之，日服二次。

附註：血淡紅者用黃色沙糖，血黑色者用黑色沙糖，无論成年、儿童，均可尽量服之。

32、主治：大腸下血，服薬无效者。　邓德光

方薬：倒插花十二朵　挽子肉（豬項下刀口肉）

用法：将薬煨肉吃即癒。

禁忌：辛辣

33、主治：便后血　李中品

方薬：苦参　生地　槐花

用法：水煎服。

34、主治：小便溺血　支竹舫

方葯：鮮藕不拘多少

用法：将鮮藕絞汁，一次頓服。

附註：連服数日，血即止，如无鮮藕，可用藕节煎汁内服。

小便血症（溺血）

35、主治：小便下血

方葯：旱蓮草　車前子各等分

服法：搗自然汁，每日一次，空心服。

36、又方：

主治：小便下血，痛不可忍。

方葯：淡豆豉

服法：煎水服。

37、又方：

方葯：車前草根叶十二两

服法：搗自然汁服

38、又方：

方葯：鯽魚鱗（瓦上焙干）錢半　血余煅錢半　百草霜二錢

服法：上葯研細，甜酒吞服

（以上三方系郑氏本、郑盛文献）

（汗症）

1、方名：除热止汗法　　　范机承

方葯：生地黄七錢　生箭芪四錢　山梔子三錢　条芩三錢　川黄連三錢　黄柏皮三錢　蓮子心錢半　生龙骨（打）五錢　生白芍三錢　生甘草錢半

用法：水煎服四次。

2、方名：驅风止汗法　　　范机承

方葯：北箭芪五錢　炒白朮三錢　云防风錢半
用法：水煎服三次。
3、方名：回阳止汗法　　　　　　　　范机承
方葯：炙箭芪四錢　制附片四錢　淮光条四錢　頂肉桂錢半　炙甘草三錢
用法：水煎服四次。
4、方名：治盜汗方　　　　　　　　范机承
方葯：露桑叶五錢　五棓子四錢　浮小麦四錢　淅麦冬九枚　山梔子(打)四錢　生甘草三錢　生龙骨(打)七錢
用法：水煎服四次，可連服两剂。
5、方名：斂汗方（外用）　　　　　　范机承
方葯：何首烏末　五棓子末
用法：二味用水調放臍眼上，汗止即取去，切勿久放。
6、主治：自汗、盜汗（外用）　　　　　文竹舫
方葯：龙骨一两　牡蠣一两　共研細末
用法：用紗布包，扑于身上。

（虛劳）

1、方名：治痨热方　　　　　　　　邱志明
主治：肺痨宿热伤液，腰中有两埂者。
方葯：当归三錢　貝母三錢　苦参三錢　茯苓二錢　白朮二錢　天冬三錢　麦冬三錢　生地三錢　黄柏三錢　知母三錢
用法：水煎服。
2、方名：加味太平丸　　　　　　　邱志明
主治：肺痨

方葯：天冬四錢　麦冬四錢　款冬花四錢　知母四錢　貝母四錢　当归四錢　黃連三錢　生地三錢　熟地三錢　杏仁三錢　阿胶珠三錢　京墨二錢　射香(另研)三厘　薄荷二錢　桔梗二錢　炙草二錢　黃柏二錢　共研細末。

制法：先将蜂糖煎化，后入葯末，数沸后，加麝香和勻成丸。

服法：每服五錢，早晚各一次，白开水送下。

禁忌：生冷。

3、方名：治消渴（糖尿病）方　　支竹舫

主治：口渴引飲　小便多带有甜味

方葯：淮山葯一两　大生地一两　鴙內金三錢　生黃芪五錢　淨山萸五錢　生豬胰子三錢

用法：水煎服，每日一剂。

4、主治：腎虛腰痛　　李登邦

方葯：杜仲　故子　二味研末

用法：将上葯蒸豬腰子吃。

禁忌：酒及生冷。

（黃疸）

1、方名：治黃疸症方　　李中品

主治：眼黃、身黃、尿黃

方葯：地星宿二两取汁

用法：将葯煎濃取汁，用黃金物品同煎，服三次，黃卽退去。

禁忌：燥火之物。

2、主治：黃疸症，黃色黯者　　李中品

方药：茯苓　厚朴　白朮　干姜　益母草

服法：水煎服。

（肿脹）

1、主治：肢体肿脹　　白兴安

方药：岩瓜子

服法：打鸡蛋吃。

2、主治：胸腹肿硬，难得轉側（脉弦滑）　　楊紹昱

方药：防已六錢 茯苓八錢 黄芪七錢 桂枝五錢 甘遂三錢

服法：水煎服。腹化軟。

3、主治：湿热气滞 两足发肿 脉象沉緩 舌色黄滑　黄一誠

方药：薏苡仁八錢　黄柏四錢　知母四錢，云苓三錢半　川木香三錢半　牛夕三錢　粉草二錢半

服法：水煎服。

4、主治：气虚浮肿、水肿，均可治。　　王平州

方药：岩白菜根，煎水服，煨肉亦可。

附註：上药产于岩夹内，开小黄花，叶如胡豆叶，有細毛，輕病一料卽愈，重則两料至三料，每用一两，屡用均效。

5、主治：慢性腎炎　　王渊泉

方药：陈葫芦五錢　紅枣数枚

服法：煎湯服，日服三次。

?、主治：腎虚　足冷肿痛　　楊紹昱

方药：山药四錢　茯苓四錢　泽泻三錢　熟地七錢　枣皮四錢　丹皮三錢　肉桂一錢　附片一錢五分　木瓜三錢　牛夕三錢　杜仲五錢　当归三錢　杭芍三錢

服法：水煎温服。

禁忌：生冷辛燥。

7、主治：腎脏病腹水　　李柏銘

方葯：五灵脂半生半熟二两　制香附二两　黑白丑各一两　商陆根一两　共为末。

服法：每服二錢，一日三次，开水送下，七日症状消退。

禁忌：盐五十天。

8、又方：　　李柏銘

方葯：連翹　銀花　桔梗　前胡　枳壳　川連　知母　石羔　榔片　寸冬　生地　雄黃　甘草　淡竹叶

9、主治：心脏病浮肿

方葯：黃芪一两　防已一两　桂枝四錢　茯苓一两　广皮五錢　服二剂有效。

10、方名：治肿脹方　　蔣远謀

主治：水肿腹脹，腸胃消化不良

方葯，白蘿卜（老的切片，晒干，半炕半炒）一两　冰片一錢　枳壳二錢

制法：先用蘿卜片同枳壳研为細末，后加入冰片末，三味乳匀。

服法：每服一錢五分　—三錢（成人量）孕妇亦可服，白开水送下。

禁忌：豆类及硬食。

11、方名：治水肿病（急性腎炎）　　吳玉清

主治：水臌，气串皮（不治箐箕臌）

方葯：黃花桊（黃草）亮稿柴　野葵花根(均用中皮)

用法：将以上三味晒干（忌火炕）研末，每服四分。

禁忌：百日不吃盐，并忌鷄肉、母豬肉、糖等。

附註：如肿不消加鷄心檳榔、茅草根、葵花心、煎水

服。不效，再用荚梨根煨豬脚吃。再不效加干葫芦干笋子吃。肿消后应服断根葯（即原方三味再加土狗、蟋蟀、蚱蜢、螳螂等。）另用盐三斤，打成寸把厚小块，放火上燒起泡，用火鉗夾起，刮下泡和前七味炒（爆則提起）連續炒三次，取起研服，服后即可开禁，服时可加雄豬肉三两同吃。

12、主治：水肿病初发，腹部肿脹甚者（腎脏炎） 陆玉成

方葯：干葫芦壳二两（陈）五花肉（豬腹部肉）

用法：將上葯和肉燉烂后去葯，吃肉和湯，一日分三次服尽，不放盐，尿多肿消。

13、主治：治肿块方 脚气肿滿 心腹脹痛 痞結脇下 有块如石 昏困且死 （洪氏本）楊紹昱献

方葯：杉木节一两 橘皮一两 大腹梹榔七枚（連子搥碎）

用法：上葯分为二服，每服用童便一碗同煎，若一服得利，大下后块散气通，即停后服。

14、又方：治脚窦肿大，昏厥状似血暈。（洪氏本）楊紹昱献

方葯：白牛粪（在山中久經风雨漂白者）

用法：上葯放瓦上焙干为末，調酒敷肿处，用布包紧，毒水出即愈。

15、方名：枣子綠矾丸 （洪本氏）楊紹昱献

主治：黃胖病

方葯：針砂 綠矾（炒） 蒼朮（米泔浸） 油厚朴 陈皮 神曲（炒）各一两 甘草五分

用法：上葯共为末或枣肉丸，或醋糊丸，米湯送下。服五十丸。

禁忌：蕎麦、羊肉、老母豬肉。

16、又方：治黃肿病 （洪氏本）楊紹昱献

方葯：黑矾八两

用法：将上葯日晒夜露二十一日，为末，枣肉为丸，綠豆大，每服九丸。早午晚各进一服，日服三次，三七日愈。小儿只服三丸。

17、又方：治气黃病　　（洪氏木）楊紹昱献

方葯：蛇蜕五錢

用法：用棍子挑于灯上燒炼焦滴成珠，以多年陈麻楷团燒灰，取一錢和匀为末，黃酒調服，一日三次，三日見效。

（心胃痛）

1、主治：冷气心痛，痛不可忍。　　王平洲

方葯：用鴿糞燒存性，米酒吞服，一次即愈。

附註：如痛不可忍，用蚯蚓焙干，乳香等分，指甲少許，共为末，鋪在紙条上（单紙、皮紙均可为撚，灯上燒煙以鼻嗅之，口含冰水，有涎吐之，飲以好茶二三次，必愈。

2、主治：心气病　　張　琼

方葯：雪梨或东川梨

用法：将整个梨用公丁香十二顆，装进梨皮內蒸热吃一二次便好。

3、主治：心胃病　　王云臣

方葯：胡桃仁一个　鴉𪍿皮二个

用法：搗烂开水吞服。

4、主治：年久胃痛，諸葯无效。　　罗春台

方葯：茨梨去子（无茨梨时可用茨梨根代）

服法：将上葯熬水当茶飲，連服一周有奇效。

5、主治：胃脘疼痛　吐酸　　楊紹昱
方葯：干柿花半斤，（用鮮柿放柴火內炮熟更佳）
服法：每日二次，每次四两，連服一周。
禁忌：冷食。

6、又方：
方葯：卽前方加芒硝九錢　潞参九錢　炮姜二錢五分
服法：水煎服，服后泻痰沫为驗。
禁忌：同前。

7、方名：蜡矾丸（借用）　　吳継歧
主治：消化性潰瘍
方葯：淨黃腊一两　明矾一两（研末）
制法：先将腊溶化取起随以矾末和匀乘热速撚丸，如桐子大。
服法：每服5——10粒，开水送下，空心及临臥时服。

8、主治：胃痛　　李志才
方葯：白蛇胆（又名莅菜蓮）1——3錢
服法：熬甜酒吃。

9、主治：胃脘痛极，須用手按，手足冷。　　吳継歧
方葯：土秦艽五錢
服法：水煎服。

10、主治：胃脘痛　　封藻华
方葯：皂角一两去子，炒焦，研末。
服法：每服一錢，酒送下，甚效。

11、主治：心胃痛　　范机承
方葯：眞沉香二两（要沉水的才眞）广木香一两　麝香七分　香附子三两（醋炒）　姜二两四錢（酒炒）　烏葯一两（面炒）　枳壳二两　五灵脂二两　制乳

香七分　山查麦芽谷五錢　通草五錢　上十五味共为末，甆瓶收貯，勿使洩气。

服法：溫开水吞一錢，服1——3次即好。

12、主治：心胃痛

方葯：荔枝核二十个　牙皂煅三片　吳于一錢

用法：上三味共研为末，甜酒送下。

13、主治：胃痛

方葯：紅枣七个去核搗　橘皮三錢　生姜一片

服法：水煎服。

14、又方：

方葯：良姜　香附各用酒浸晒三次

制法：等分为末

服法：1、因寒而起者，服良姜二錢，香附一錢。

2、因怒气而起者，服香附二錢，良姜一錢。

3、米湯送下。

15、主治：心痛

方葯：烏梅一个　紅枣二个　杏仁七个

制法：上三味搗如泥，

服法：男用酒吞服，女用醋吞服。

以上四方郑氏本郑盛文献

（胸脇痛）

1、主治：治肋間痛　　陆茂恒

方葯：牛舌片

用法：半煎酒服，半作外包。

2、主治：寒凝气滞（左脇下滞痛胃脹）。　黄一誠

方葯：大黄四錢　附片二錢半　細辛錢半　半夏

四錢　广皮三錢　云苓三錢　甘草錢半　炙香附四錢　水煎服。

3、主治：胸肋疼痛　　　　　　　　　支竹舫

方葯：广木香三錢　郁金一錢　沉香五分　共研細末

服法：每日服二錢（早晚分服）白开水送下。

禁忌：食肉。

4、方名：治血痰結胸方　　　　　　　楊紹昱

主治：面赤身重　起則欲倒　呼吸迫促　胸部紧張　脉洪滑

方葯：蒼朮四錢　陈皮三錢　厚扑五錢　炙草二錢半　繩板八錢（生用）礞石三錢煅

服法：水煎服，服后必大吐，血痰从口中頻出，吐尽身輕瘉。

禁忌：阴虛生痰者忌用（脉細者）孕妇忌服。

5、主治：阳毒結胸　按之极痛　或通而复結　喘促　大燥狂乱　　　　　　　王平洲

方葯：生蚯蚓四两　姜汁　白蜜　薄荷汁适量　冰片二分

制法：用蚯蚓洗淨搗泥，入姜汁少許，白蜜一匙，薄荷汁少許，冰片二分，新汲水調服。

附註：服葯后揉心下片时，自然汗出而解，如不应再服一料即愈。

6、主治：喉燥胸辣　血痰結胸　　　　　楊紹昱

方葯：云苓四錢　法夏三錢半　广皮二錢　瓜蔞仁五錢　生地八錢　丹皮三錢　茜草二錢　炙草二錢

服法：水煎服，病退后速用养阴剂，（如六味地黄湯）

禁忌：飴糖　辛燥　孕妇忌服。

（腹痛）

1、主治：左側腹部偏痛 小便澁如淋状 大便不暢　楊紹昱
方葯：大黄三錢　桂枝三錢　云苓五錢　豬苓四錢　泽泻四錢
服法：水煎热服。
禁忌：豆类、肉丐五辛。

2、主治：繞臍腹痛　大便溏　楊紹昱
方葯：大黄三錢　附子五錢　細辛一錢　葱白五根
服法：水煎服。
禁忌：冷食。

3、主治：右側腹部偏痛　手压則不痛　楊紹昱
方葯：木香五錢盐水炒
服法：水煎服。
禁忌：生冷。

4、主治：腸痛　楊紹昱
方葯：皂角刺五十根炮黄
服法：水煎服。
禁忌：硬食（一周以外）生冷。

5、主治：腹膨脹，（手术后腸痲痺）　李世凱
方葯：生姜皮三錢　桑白皮三錢　茯苓皮三錢　大腹皮三錢　牡丹皮四錢　砂蔻仁三錢　薏苡仁六錢　厚朴二錢　木通二錢　甘草二錢　大枣二个

6、主治：肚子忽然疼痛　嘔吐　心中难过　吳継歧
方葯：枳实　厚朴　木香　官桂各二錢　生香附(打)七錢　台烏四錢　梹榔三錢　明矾二錢
服法：水煎服，半小时可愈。

7、主治：腸痛（兰尾炎）腹右痛硬　手按則痛剧　右腿攣縮　大便艰澁　属热性者　　　　楊紹昱

方葯：大黃三錢　丹皮五錢　桃仁三錢　玄明粉二錢

服法：水煎温服。

禁忌：燥热。

8、又方：　　　　楊紹昱

主治：腸痛　腹右痛　按之濡軟　痛剧　右腿屈不能伸　属寒性者

方葯：薏苡仁八錢　附片三錢　敗醬三錢　蘽仁五錢

服法：水煎温服，服后泻五花膿数碗为驗。

禁忌：硬食（一周以外）生冷。

（吐泻）

1、主治：消化不良　吐泻　　　　潘炳先

方葯：云苓三錢　白朮二錢　淮山三錢　扁豆三錢　木香二錢　党参三錢　苡仁三錢　甘草錢半　生姜三片　大枣二个

服法：水煎上葯、加灶心土澄水对服。

2、主治：霍乱吐泻　　　　王云臣

方葯：魚香菜　桐油

用法：将桐油滴在魚香菜叶上包好，开水吞服。三至五岁者用叶三皮，大人酌加。

3、主治：嘔吐（因食冷热不合者）　　　　王云臣

方葯：路边黃一两　桃仁三个

用法：将上葯搗碎开水吞服。

4、主治：上吐苦水　下泻綠水　头痛　胸腹痛　痞　　　　方燕宾

方葯：黄芩酒炒三錢　半夏醋炒三錢　川連二錢半
石蒲二錢　山梔二錢　油朴三錢　滑石錢半
化紅三錢　竹茹一錢　草果仁一錢　甘草一錢
生姜三片

禁忌：油糖、生冷、米湯。

5、主治：暑熱霍乱　方燕宾

方葯：半夏（醋炒）三錢　酒芩三錢　川連二錢半　石蒲二錢　甘草一錢　草果仁一錢

服法：水煎服。

禁忌：米湯、油糖、生燥。

6、主治：消化障碍（不思食、腹脹痛、輕泻）　李世凱

方葯：白朮四錢　茯苓　神曲　麦芽　山查　蔻仁各三錢　砂仁二錢　生姜三片　大枣三个

服法：水煎服。

7、主治：霍乱吐泻　范机承

方葯：①大蒜五瓣嚼濫冷水呑下，三十分鈡卽止，小儿忌服。

②白胡椒末五錢　生蒜一个打濫　雄黃五錢　紅沙糖五錢　燒酒四两　共入鉢內搗匀，倒在杯里，燃酒至火灭为止，温度到四分之三的时候，一口呑下，吐泻立止。

禁忌：油和稀飯、米湯三天。

8、又方：　范机承

方葯：附片四錢　干姜三錢　党参三錢半　白朮四錢　蒼朮三錢　丁香九粒　炙草四錢　煨服三、四次

禁忌：油、面。

9、又方：　　　　　　　　　　　　　　　　　范机承

主治：虚泻不止

方药：訶子肉三錢半　縮砂仁三錢　赤石脂三錢半　肉桂一錢　龙骨四錢　破故子三錢　蓮子肉(打)一两　白朮四錢　炙甘草三錢

服法：煨服四次，可連服两剂。

10、主治：腹泻而渴　　　　　　　　　　　范机承

方药：党参四錢　白朮四錢　云苓四錢　葛根五錢　广香錢半　藿香錢半　生甘草二錢　煨服三四次，多只两剂。

禁忌：油、面。

11、主治：五更泻　久不止　属阴盛者　　　范机承

方药：破故子四两　五味子(炒)一两二錢　吳茱萸（盐汁炒）五錢　紅枣十二个　核桃肉去皮四两　同搗为丸

服法：睡时服四錢或五錢，用盐湯下，服完一料可痊愈。

12、主治：泄泻无度

方药：生大蒜数瓣切碎

服法：开水吞服，立愈。

13、主治：水泻　　　　　　　　　　　　　支竹舫

方药：山查(炒)一两　生姜三片　紅糖五錢

服法：水煎服。

14、又方：

主治：水泻不止　　　　　　　　　　　　　支竹舫

方药：火腿骨头

制法：炙炭研末

服法：每次三錢　連服二、三次可痊。

（疟疾）

1、主治：疟疾　李鎮平

方葯：草果（或楊柳尖）茶山叶（常山）桃叶

用法：用桃叶草果煎湯呑常山末。

2、主治：疟疾　李伯銘

方葯：生常山半斤　生白矾四两　共研細末醋糊为丸，如綠豆大。

用法：每服5——7丸，一日二次，小儿愼用。

3、主治：疟疾　李伯銘

方葯：柴胡　法下　黃芩　花粉　白芍　甘草　蜀漆

用法：水煎服。

4、主治：疟疾（塞鼻葯）　李伯銘

方葯：蒼朮　白芷　桂枝　川芎

制法：各葯研細末，用紗布裹葯塞鼻，在发病前半小时使用，須着进一步研究。

針灸：疗疟法　李伯銘

穴位：大椎　內关　足三里　列缺　合谷

随选一二穴有效。

5、主治：寒少热多　食疟　温疟　口渴　胸痞　大小便难

方葯：枳实三錢　油朴三錢　連台三錢　貝母三錢　黃芩三錢　法下二錢　梔仁二錢　生军二錢　黑热甚加川連一二錢　大便燥結，可加大黃三錢。

用法：水煎服

禁忌：不消化食物，油糖生冷。　方燕宾

制服：将上葯熬成膏，日服六錢，分三次服。

6、主治：瘴疟（昏悶嘔吐　寒甚热少或热甚寒脉少，弦、舌滑而腻　間或三日而作者）　顧仲培

方葯：胡豆連（又名山胡豆）二——四錢　蜂蜜五錢　黃酒二錢

用法：用黃酒和开水冲蜜送下。

禁忌：葱、酸、腥、辛、燥、发物。

7、主治：諸疟皆效　楊紹昱

方葯：密陀僧（金黃色，不拘多少）醋炒七次（研为細末）用胶囊装（每囊二分）

服法：每次一粒，日二次，飯前服。

8、主治：間日疟　楊紹昱

方葯：別甲一两（醋炒）明雄一錢半　共为細末

服法：成人每次一錢，日二次，小儿酌减，孕妇忌服。

9、主治：疟疾　黃昇阳

方葯：常山二錢（酒炒）烏梅肉四枚烘干研細为丸

服法：在疟未发前二小时，开水吞服效。

10、主治：寒疟痰疟　黃昇阳

方葯：老生姜四两　洗淨連皮搗烂挤汁露一夜

服法：在疟未发前三小时，将汁吃完，疟即止。

11、主治：单寒疟　范机承

方葯：广陈皮三錢　炮姜四錢　青皮三錢　蒼朮三錢　法下四錢　藿香三錢　草果三錢　茯苓四錢　党参三錢　炙草錢半　紅枣四枚

服法：煎服三四次，不愈再服一剂。

12、主治：单热疟　范机承

方葯：痲黃二錢半　桂枝錢半　杭芍四錢　云苓五錢

瓜霜三錢　生甘草三錢　生姜三片　紅枣四枚

服法：煎服三次。

13、又方：寒芷疟　　　　　　　　范机承

方葯：北柴胡七錢　条芩六錢姜汁炒　党参三錢　广皮三錢　法下四錢　干姜三錢　草果三錢　桂枝尖三錢　炮生姜四錢

服法：水煎服，可連服二剂。

14、又方：热盛疟　　　　　　　　范机承

方葯：北柴胡一两　条芩三錢半　括蔞根四錢半　京下四錢半　粉草三錢　生石羔八錢　西洋参一錢半（切細分三次和葯呑服）

服法：水煎服，可連服二剂。

15、又方：生石羔一两　淮知母三錢半　大生地八錢　桂枝三錢　粉草二錢　粳米半杯　　　　范机承

服法：水煎服。

16、主治：久疟　　　　　　　　范机承

方葯：党参四錢　白术四錢　山葯四錢　生地四錢　当归四錢　白芍三錢　烏梅肉三錢　广皮三錢　法下四錢　醋炙別甲三錢　常山苗二錢　炙甘草二錢　生姜二片　大枣七枚

服法：水煎服。

（痢疾）

1、主治：痢疾　　　　　　　　楊紹昱

方葯：苦参四两　木香四两　甘草一斤

附註：白痢干姜湯送下，紅痢、禁口痢蓮肉縮砂湯送下。

2、主治：紅白痢　发燒　腹痛　　　　　　　　李世凱

方葯：白头翁三錢　黃芩三錢　黃柏三錢　黃連三錢

服法：水煎服。

3、主治：紅白痢　　　　　　　　　　　　　李登邦

方葯：拳黃箕（又名蛇疙瘩）

服法：打成片，熬水服。

禁忌：油、糖。

4、方名：复方痢疾丸　　　　　　　　　　　李伯銘

主治：痢疾

方葯：白芍二斤　黃連半斤　黃芩半斤　檳榔五两　当归半斤　木香五两　安桂三两　柴胡十两　大黃半斤　甘草六两

制用：将上葯合研細为丸，成人每次一錢半，儿童酌減。

附註：如慢性痢加鴉胆子二十粒同服。

5、主治：痢疾　　　　　　　　　　　　　　王淵泉

方葯：玉米灰包

服法：食前成人一次服小半匙，小儿酌減，日服三次，开水冲酒溫服。

禁忌：生冷及不易消化食物。

6、主治：痢疾　　　　　　　　　　　　　　李登邦

方葯：苦芹菜根

用法：搗取汁，开水冲服。

7、主治：痢疾　　　　　　　　　　　　　　汪黃氏

方葯：銀花根　杜仲

用法：水煎服。

8、主治：久痢不止　　　　　　　　　　　　陈輝龙

方葯：酸石榴皮三两　五棓子一两　地于一两　槐花二两　銀花炭一两

用法：将各葯研細末，开水吞服，日服二次，每次一錢。

附註：紅痢加紅糖兌开水，水泻加肉桂粉同服。

9、主治：紅白痢疾　　　　黃昇阳

方葯：銀花四錢　甘草二錢　陈茶叶四錢　独头大蒜一枚，无則用一般大蒜切片。

用法：将上葯煮取汁一大碗，一日分三次服，連服三日愈。

10、又方：治紅白痢　　　　黃昇阳

方葯：桊萉叶

用法：每次用干的二两煎汁，加白糖調服，連服三天。

附註：要冬天採集洗淨，放于树枝上或草房上，經过冬霜，待来年立春前一日，收缸中备用。

11、主治：紅痢　　　　范机承

方葯：当归三錢　炒枳壳三錢半　杭芍四錢　青皮一錢　梹榔二錢半　广香錢半　縮砂三錢　条芩三錢　黃連錢半　庄黃錢半　炙草五錢　滑石一两

用法：水煎服。

12、又方：白痢　　　　范机承

方葯：柴油朴三錢　泔蒼朮三錢　茯苓四錢　豬苓四錢　广陈皮三錢　广木香二錢　縮砂三錢　干姜三錢　炙草四錢　生車前草三柯。

服法：水煎服。

13、主治：赤白痢　　　　顧仲培

方葯：蘿卜桊汁　生姜汁　紅白糖　陈茶叶

制法：赤多者加姜汁，白多加重紅白糖，煎茶叶濃汁冲服
禁忌：生、冷、酸、硬食、燥火各物。

（风湿瘫痪痿）

1、方名：治风痺方　　　　楊紹昱
主治：左膀痲痺不仁
方葯：桂枝三錢　杭芍三錢　炙草二錢　桔梗二錢　防风二錢　生姜三片　大枣三枚　台烏五錢　羌活錢半
用法：水煎温服。
禁忌：生冷。

2、方名：治风痺方　　　　楊紹昱
主治：右膀痲痺不仁
方葯：黃芪六錢　桂枝三錢　杭芍三錢　炙草二錢　白芷錢半　殭蚕一錢　生姜三片　大枣三枚
用法：水煎温服。
禁忌：生冷。

3、主治：半身痲痺　項背不仁　　　　楊紹昱
方葯：桂枝三錢　附片二錢　川芎一錢　痲黃二錢半　潞参二錢　杭芍三錢　杏仁二錢　防风二錢　黃芩三錢　防己四錢　甘草二錢　木瓜五錢
用法：水煎温服。
禁忌：生冷。

4、主治：半身不遂　　　　陈德俊
方葯：白荆条須根二錢　豬脚一对不去筋
制法：先将豬脚煮湯去肉，再将湯煨葯去渣。
用法：令患者熟睡，喚醒先吃肉后服湯，服后勿起床。

輕者一剂、重者两剂必愈。

5、主治：下肢癱瘓　　　　　　　　　　李正明

方葯：魚鳅串根一两　黑附片五錢

用法：燉鴉服

禁忌：生冷酸，孕妇忌服。

6、主治：膝关节　时关节局部发炎肿痛　　　支竹舫

方葯：生蚕豆四十粒　白糖二两

制法：将豆用开水泡透搗烂，加白糖和匀。

用法：敷肿痛处，隔一宿換一次，三次有效。

7、主治：风湿腰痛、脉細弦。　　　　　　楊紹昱

方葯：云苓四錢　桂枝三錢　白朮三錢半　甘草二錢半　桑寄生五錢　独活五錢

用法：水煎温服。

禁忌：生冷。

8、方名：关节炎驗方①　　　　　　　　王平洲

方葯：羌活五錢　独活五錢　桑枝七錢　淮牛夕三錢　川芎五錢　当归五錢　紅花三錢　秦艽五錢　防风五錢　防已三錢　苡仁一两　附子三錢　上桂一錢　乳香五錢　沒葯五錢　海风籐五錢　炙草一錢

如刺痛加虎骨三錢，痛止后加黃芪党参各三錢。再續服次方数剂，并加用灸法。

6、方名：关节炎驗方②　　　　　　　　王平洲

方葯：菊花一两　石斛五錢　天雄五錢　党参五錢　附子五錢　甘草三錢　山葯三錢　續断三錢　黃耆三錢　泽泄三錢　远志三錢　細辛三錢　秦葦三錢　石葦三錢　牛夕三錢　菖蒲三錢　杜仲三錢

茯苓三錢　干地黃三錢　防风三錢　白朮三錢
干姜三錢　萆薢三錢

用法：上葯共为細末，每服錢半，一日三次，溫酒調服。

10、方名：关节炎灸法　　　　　王平洲

穴位：足三里　悬鈡

灸法：用麝艾隔姜灸，每穴可灸至百壮，分三日灸完。

禁忌：生冷。

11、主治：瘫痪

方葯：党参、白朮　当归　川芎　熟地　秦艽　独活
香附各三錢　羌活　附片　防己　苡仁　木瓜
牛夕各二錢　肉桂一錢

服法：水煎服。

12、又方：

方葯：当归三錢　撫芎二錢　茯苓三錢　陈皮三錢　法夏
二錢　香附三錢　烏葯一錢　羌活二錢　防风二
錢　白芷二錢　麻黃去节一錢　北辛八分　甘草
五分　生姜三片

服法：水煎服。

13、主治：冷骨风

方葯：蒼朮　白芷　川芎　陈皮　羌活各三錢　独活
桑寄生　秦艽　防己　木瓜各二錢　苡仁　肉桂
桂枝各三錢　附片　川烏　甘草各二錢　紅牛夕
二錢　酒引

服法：水煎服。

（以上三方系郑氏本，郑盛文献）

14、方名：立患丹（外用）　　（洪氏本）楊紹昱献

主治：湿气两腿作痛

方葯：艾叶二两　葱头五根　生姜二两

用法：上葯搗烂，用布共为一包，蘸极热燒酒搽患处，以止为度。

15、又方：治足痺发痛，肾气虛弱者（蒸法）

（洪氏本）楊紹昱献

方葯：川椒二两　香葱一斤　小麦面三升　燒酒一斤　青盐二两

用法：上葯共为末，入酒和匀于鍋內炒，令极热，摊卧褥上，将患处就卧褥放葯上熏蒸，薄被盖，令汗出匀遍时許撤去炒葯面，只就熏褥中卧两个时辰待汗解，勿令見风，立效。

16、方名：除湿湯（外用）　（洪氏本）楊紹昱献

主治：风湿凝注足膝作痛

方葯：人信二两

用法：上葯用水煮滚热，入毡片（剪作底样）七八片同煮，令汁干为度，取出毡片烘干，包在脚板上，出汗，如毡湿透，再換一片，連換数片尽即已。

17、方名：洗足湯　（洪氏本）楊紹昱献

主治：风湿足痛

方葯：羌活五錢　独活五錢　白芷三錢　川椒一两　荆芥穗一两　木瓜五錢

用法：上葯用水一壶，煎至半壶，傾出去渣，于避风处温浴，洗后仍用花椒炒热，綢包熨患处，或用炒盐熨亦可。

18、主治：脚风頑痺　腰膝疼痛　（洪氏本）楊紹昱献

方葯：海桐皮二两五錢　薏苡仁三两　生地一两　川芎一两　羌活一两　五加皮一两　地骨皮一两　粉

草五錢　好燒酒二十斤

用法：將布袋盛葯放罈密封，以水煎滾約煮一时久，取出退火毒，过三日随量酌飲，每日早、中、晚各服一次，以微熏为度。

19、主治：四肢麻木癱瘓　久病不起　　　罗春台

方葯：黑附片半斤　老公鸡（十年以上）一支

制法：將老公鸡宰后去毛洗淨，挖出肚腸，砍去头足不用，將附片装入鸡肚內，放鉢內蒸（如蒸汗鸡样）至鸡爛熟后酌加少許盐味，服完为止（視病輕重服1——3支）

服法：須在夏天（三伏天）服食，病重者，初伏时一剂，中伏一剂，末服一剂，无不奇效。

禁忌：生冷。

20、方名：治熱痿方　　　楊紹昱

主治：两足痿廢　平素好酒　嗜辛辣酸　热痿者

方葯：生地八錢　玄参六錢　菊花四錢　北枸杞三錢　云苓四錢　山葯八錢　泽泄四錢　枣皮四錢　丹皮三錢　白芥子三錢

用法：水煎温服。

禁忌：辛辣之物。

21、方名：治寒痿方　　　楊紹昱

主治：两足痿廢　属阴虛寒痿者

方葯：黃柏二两五錢　熟地八两　龟版六两　当归四两　知母二两五錢　蒼朮二两五錢　炮姜一两五錢　肉桂一两　虎骨炙酥四两　牛膝三两　羊肉斤半

制法：先將羊肉煮烂，余葯共研細末合丸。

服法：一日三次，每次四至五錢，盐湯吞服。

禁忌：房事及生冷。

（前阴）

1、方名：火炮酒　　　　　　　　　　　　聶华彬

主治：縮阴

方葯：燒酒一两　火炮三个（搡去白灰）

制法：將燒酒放入杯內，点火炮嘘花入酒內，將酒飲之，立即复原。忌生冷三日。

2、主治：阳痿早泻　　　　　　　　　　　李中品

方葯：蛤蚧一对（全好）　雄蚕鵝三錢

制法：用香油酥黃为末，临睡时开水服。

3、主治：縮阴　　　　　　　　　　　　　李中品

方葯：四逆湯（先服此湯）

附註：外用胡椒兌飯搥幷，放在臍上，或用葱垫臍上，用熨斗熨之，阴出即愈。

4、主治：阴莖內素痒　　　　　　　　　　楊紹昱

方葯：生地五錢　云苓三——五錢　丹皮三錢　泽泻四錢　棗皮三錢　淮山四錢　黃柏二錢　苡仁五錢

服法：水煎服。

禁忌：辛、燥。

5、主治：龟头紅肿　　　　　　　　　　　楊紹昱

方葯：生地四錢　薄荷一錢　桔梗二錢　車前三錢　当归四錢　木通三錢　胆草三錢　黃芩三——五錢　苦竹叶三十片

服法：水煎溫服。

6、主治：縮阴走子（外洗）　　　　　　　范机承

方葯：土酒半斤　生姜半斤　食盐一两五錢

用法：先将食盐炒黄，再放水，姜酒同熬好，溫洗周身，被复而臥，得汗为度。

7、主治：縮阴

方葯：火葱　胡椒　生姜　麝香少許

制法：将上葯搗后，炒飯。

用法：乘飯热貼臍眼中。

8、又方：

方葯：有汗篦子一把燒灰　燒酒

服法：将篦灰冲酒服。

9、又方：

方葯：熟地一两　附片八錢　干姜五錢　黃芪三錢　桔梗二錢　橘核二錢　小茴二錢　甘草一錢

服法：水煎服。

10、又方：

方葯：肉桂三錢　洋参三錢　母丁三錢　白豆蔻七个　茯苓三錢　香附三錢　吳于二錢　小茴二錢　川芎三錢　元胡三錢　广皮三錢　当归三錢　厚朴三錢　干姜三錢　炙草三錢　酒引

服法：水煎冲酒服。

（以上四方系郑氏本，郑盛文献）

11、主治：縮阴走子內服　　王銀臣

方葯：泡参五錢　雪里箭五錢　五甲西五分

服法：煎水服，日三次。

12、主治：阳痿　　王渊泉

方葯：党参　黃芪　肉桂　巴戟　鎖阳各五錢　山葯　故紙　小茴各四两　兎絲四两　川芎　杜仲炒各一两　附子一个

服法：炼蜜为丸，白湯送下。

（小便）

1、主治：小便不通　　　　　　　　（洪氏本）楊紹昱献

方葯：大黃三錢　滑石六錢　皂角三錢

服法：水煎、冲酒服。

又方：白菊花根搗烂（生用），白酒冲和，取酒汁飲之。

2、主治：阴署寒入腎經　小便閉塞

（洪氏本）楊紹昱献

方葯：蓽澄茄　吳萸各五錢

用法：水煎服，即通。

3、主治：小便不通

方葯：莧菜梗

服法：熬水服。

4、又方：

方葯：食盐

用法：炒热食盐熨臍中。

5、又方

方葯：葱管　食盐（研末）

用法：将葱管吹食盐入玉莖中。

6、主治：老人夜多小便

方葯：益智仁　川蓽薢　黃金树上寄生包等各一分

服法：上葯燉豬肝吃。

附註：連服三个，特效。

7、又方：

方葯：貫仲　甜酒

服法：貫仲熬甜酒温服。

（以上四方系郑氏本，郑盛文献）

8、主治：青年遺尿　　支竹舫

方葯：桑螵蛸二两　益智仁五錢

用法：将上葯研細末，面糊为丸，如桐子大，睡时服二三十丸，用开水吞下。

9、主治：小便不通　　支竹舫

方葯：車前草一棵　独蒜一枚　田螺二个

制法：加盐少許，共同搗烂。

用法：烘熱貼臍口，布条縛束。

10、主治：遺尿　　支竹舫

方葯：鮮雄鷄肝一个　官桂末

制法：雄鷄肝炕干研末，官桂用同肝蒸。

服法：成人服一錢，日三次，开水送下。

（遺精）

1、主治：遺精　　支竹舫

方葯：蓮子去心二錢　远志三錢　生龙骨八錢　牡蠣八錢　兎絲子三錢

用法：水煎服。

2、主治：梦遺

方葯：蓮子心一撮　辰砂（飞淨）三分

服法：上葯合研为細末，每日服二次，每次一錢，开水送下，七日可愈。

3、主治：无梦遺精

方葯：韮子炒一两

服法：上葯研末，每服二錢，酒送下。

附註：兼治白浊。

4、又方：

方葯：生大黃五錢　鴨蛋一个

制法：将鴨蛋开一小孔，生大黃末放入，用紙封固，蒸熟。

服法：酒送下，空心服。

5、主治：滑精

方葯：蒺藜炒五錢　芡实一两　蓮須炒三錢　龙骨煅三錢　牡蠣三錢

制法：上五味水煮一日夜，炙干，加炒蓮子四两，共研为末。

服法：每次服三錢，日服二次，开水送下，服完即愈。

6、主治：遺精

方葯：党参　白朮　茯苓　龙骨煅　牡蠣各三錢　白朮　扁豆各二錢　泽瀉一錢　甘草八分　兎絲餅为引。

服法：水煎服。

7、又方：

方葯：煅龙骨　牡蠣各三錢　白鸡冠花三錢　淮山二錢

制法：熬甜酒，空心服。

8、主治：梦遺或滑精

方葯：何首烏三錢　枣仁炒二錢　杭戟五錢　麦冬三錢　北味錢半　蓮子心五錢　茯神去木二錢　芡实四錢　芋肉二錢　文蛤炒黑錢半　鹿胶三錢　鹿角霜二錢　百草霜五錢

服法：水煎服。

附註：如吃至三剂时，加熟地五錢。如小腹痛，加盐炒

小茴二錢。

(以上七方系郑氏本，郑盛文献)

（五淋）

1、主治：沙淋　　陈德俊

方薪：土牛夕一两　車前草七棵連根叶

服法：水煎服。

2、主治：石淋　　李志才

方薪：猫猫咪（又名鉄螺蛳，生在岩石下）炕干研末，地瓜根　救軍粮根　羊奶奶根　九龙藤　斑鳩窩

服法：用后五味熬水，吞服鉄螺蛳末，三次卽愈。

附註：服后从小便打下两三顆小石子来，为驗。

3、方名：治沙淋方　　凌云标

主治：小便头尾澀痛　尿色黄赤　痛不可忍

方薪：皮蛋一个，用刀剖为二片，去黃不用，燒酒注滿蛋黃窩为度，放火上煮燒，待酒燒干（两瓣照此制法）

服法：每次服一半，每日二次，未愈再制服用。

禁忌：煎炒。

4、主治：白浊病久不愈　　方燕宾

方薪：土大黃（又名連鉄根，生于阴湿或水沟边）一两　紅姨嫣菜一两　雄黃三錢研末

用法：將前两薪鎚絨和入雄黃末搗匀，敷龟头上，多則三次，少則二次，卽愈。

禁忌：发物、燥火、生冷。

5、主治：血淋（莖中疼痛难忍）　（洪氏本）楊紹昱献

方薪：黑荆芥　炒梔子　熟軍

用法：上药等分为末，合丸，酌服即愈。

6、主治：石淋症　　伍少华

方药：地瓜根　救急果　九龙藤　斑鸠窩　土三七　鉄螺螄（研末）

用法：用上五味煎水，吞鉄螺螄末。

7、主治：淋痛

方药：蜀葵花根　不拘多少

服法：水煎服。

附註：如系血淋加車前子二錢同煎服。

8、主治：血淋

方药：棕皮毛（燒灰）

服法：酒吞服。

9、主治：淋病

方药：胆草八分　梔子　黃芩　泽兰　木通　甘草各一錢　生地二錢　柴胡二錢　秦归二錢　車前引

服法：水煎服。

附註：服本方后，可連服下方。

10、方药：本方加扁蓄或羊奶子莖叶。

服法：水煎服。

11、又方：

方药：鴉肫皮一个　官桂五分　白果去壳九个　益智仁三錢　腊烛花引

服法：水煎服。

12、又方：

方药：茅草根　花椒根　棕树根　公豬前左蹄。

服法：上药燉豬蹄去渣服。

附註：上三味改燉公豬火腸和糯米、酒一斤燉服，可治

內痔。

13、主治：淋病（寒未散）

方葯：党参二錢　枳壳一錢　前胡一錢　川芎一錢　柴首酒炒一錢　桔梗二錢　云苓二錢　法夏一錢　羌活一錢，黑姜一錢　独活二錢　橘核二錢　炙草一錢　盐水三滴引

服法：水煎服。

14、主治：淋病（大便結者）

方葯：生地三錢　当归四錢　酒芩三錢　灵升麻二錢　紅花五分　淮通三錢　梹榔三錢　麻仁二錢　甘草一錢　大黃一錢　車前子引

服法：水煎服。

15、主治：淋病（火甚者）

方葯：当归四錢　淮通三錢　扁蓄三錢　化石一錢　瞿麦三錢　炒梔子一錢　大黃一錢　甘草一錢

服法：水煎服。

附註：服上方后，可服补中益气湯加淮山、木通二剂。再服下方，即可全愈。

16、方葯：党参三錢　熟地四錢　五味二錢　淮志肉三錢　云苓三錢　金因子二錢　淨枣皮二錢　甘草一錢

服法：水煎服。

17、主治：血淋

方葯：陈枳壳炒七錢　海銀沙七錢　滑石七錢　黃連一两　瞿麦一两　冬青子一两　甘草五錢　王不留行一两

服法：水煎服。

又方

方葯：茜草二錢　紅花一錢　土三七五分　木通二錢

牛夕一錢

服法：水煎空心服

18、主治：血淋

方葯：馬鞭草不拘多少　甜酒半杯

制法：馬鞭草洗淨，搗自然汁。

服法：上汁兌甜酒燉湯服，日服三次。

19、又方：

方葯：小麦　童便　白沙糖

制法：小麦加童便炒。

服法：兌白沙糖調服。

(以上十二方系郑氏本，郑盛文献)

(疝气)

1、主治：左腎偏墜　　　　凌云标

方葯：細辛研末每用三分　鸡蛋一个

制法：将鸡蛋大头戳破一孔，放入細辛末，外用白紙糊好，放甑上蒸熟。

用法：将蒸好之蛋去壳一次服下，疝痛立止，偏墜立散，至重者服二次卽愈。

2、主治：气胞　　　　伍少华

方葯：見肿消三錢　猫腎子三顆

用法：小孩熬甜酒，大人蒸瘦肉吃。

3、主治：疝气　　　　李中品

方葯：干絲瓜　鸡蛋壳　二味燒灰

用法：兌酒服。

4、主治：疝气　　　　支竹舫

方葯：生姜汁一茶杯

用法：将汁貯瓶中，擱入浴室洗澡，俟周身汗出时，将姜汁傾入碗中，以阴囊浸入姜汁中，囊即微覺針刺痒感，漸次收縮，十分鈡后，姜汁悉从毛孔吸入无余，肿如瓢瓠之阴囊，而縮小如常，患者能如法使用，无不奏效。

5、主治：疝气

方葯：荔枝核五錢　上肉桂一錢　小茴香三錢　猴血結二錢　火酒　甜酒

服法：将上葯水煎好后，冲火酒、甜酒服。

6、又方：

方葯：括蔞根　甜酒

服法：将上葯煨甜酒吃。

7、又方：

方葯：独活一两

服法：水煎服。服后接服下方：

柴胡三錢　升麻二錢　香附三錢　青皮三錢　小茴三錢　羌活二錢　粉草一錢　生姜三片引

8、主治：疝气（外腎肿大）

方葯：小茴炒一两　山甲炒八錢　全蝎炒四錢　木香四錢

用法：上葯研为末，每服三錢，空心酒送下。

9、又方：

方葯：橘核　荔枝核　川楝子各等分

服法：水煎服。

10、主治：腎囊肿大

方葯：生芝麻一合　茶叶一两

用法：将上葯嚼敷。

11、主治：气包卵

方葯：厚朴姜炒二錢　枳壳二錢　木通三錢　香薷一錢半　白扁豆炒三錢　甘草一錢　車前二錢　酒一杯引

服法：水煎服。

（以上五方系郑氏本，郑盛文献）

12、方名：針灸疝气方　　　　（洪氏本）楊紹昱献

主治：木腎偏墜

取穴：闌門（穴在阴莖根兩旁各开三寸）

針灸法：針灸一寸半　灸七壮。

13、又方：灸疝气立效　永不再发

（洪氏本）楊紹昱献

取穴：外陵（穴在臍旁下一寸左右各开一寸半）

灸法：灸三至七壮。

14、又方：灸偏墜气痛　　　　（洪氏本）楊紹昱献

用葯：蓖麻子（1岁用1粒，10岁用10粒）去皮研烂。

取穴：顖門（在头頂）又令病人仰臥将兩脚掌相对，以带子縛住二中趾，于两趾合縫处取穴。

灸治：先以搗烂蓖麻子貼上顖門穴，再用艾炷（如麦粒大）灸两足中趾合縫处七壮，卽时止痛，奇效。

15、又方：治疝气偏墜肿痛不可忍　　（洪氏本）楊紹昱献

方葯：槐子三錢　炒褐色为末　入盐一錢

用法：空心黃酒送下立效。

16、又方：五棓子七个　焙存性为末 燒酒調服 以醉为度

17、又方：治疝气　　　　（洪氏本）楊紹昱献

方葯：干絲瓜簫火燒存性。

用法：每服三錢，热黃酒下。

18、又方：治疝气及心痛　　　　　（洪氏本）楊紹昰献

方葯：荔枝核四十九粒　陈皮九錢　硫磺四錢

制法：为細末，盐面打糊为丸，如綠豆大。

用法：每服九丸，黃酒送下。

附註：冷气心痛可服，熱痛不可服。

19、主治：阴囊腫大如斗　腎子痛（外洗）

（洪氏本）楊紹昰献

方葯：雄黃三两　白矾二两　甘草五錢

用法：共煎水洗。

20、又方：治气胞偏墜　　　　　（洪氏本）楊紹昰献

方葯：淨砂土　花椒　小茴　艾叶

用法：将土炒紅取起，乘热入花椒、小茴、艾叶拌匀，放入盆內，中按一窩，上盖布一片，将病者抱坐在上，遍身汗出，其胞內冷气冷血，尽化汁而出，沙土濕透再炒，如此数遍除根。

（痲风）

1、主治：痲风　　　　　　　　　　王云臣

方葯：烏梢蛇一条　四脚蛇三条　手鐲虫二两　土狗一两　地虱子五錢　蜈蚣二条

制法：上葯共研末，炼蜜为丸，如桐子大，每服四十丸。

2、主治：痲风（出外毒）　　　　　王云臣

方葯：蜈蚣三条　黑煙油一斤　蛇胆三个

用法：将煙油泡蜈蚣、蛇胆外擦。

3、主治：痲风（生肉芽）　　　　　王云臣

方葯：白矾一斤　豬胆一斤　冬青叶一斤

用法：蒸热敷疮口。

附註：本方并可治乳痈背痈等。

4、又方：治痲风（外包） 王云臣

主治：面目发紅

方葯：汽油 生姜 皂角 辣椒

用法：共搗和敷痒处，眉脫能长。

附註：如脫节頽、鼻樑坏者，需加桃仁 生豬油配用。

5、又方：治痲风（洗葯） 王云臣

方葯：苦参根一斤 花椒半斤 大种火痲一斤 煙骨头一斤 紅苦連半斤 苦絲子一斤 三角风半斤 九里光半斤 一扫光一斤 烏头半斤

用法：煎水外洗，一星期一次。

（以上七方系王云臣献）

（杂症）

1、主治：风斑初起、发痒，見风越出。 顧仲培

方葯：苦葫芦三錢——一两（即瓢把葫芦）新陈均可

服法：水煎温服，每日服六次即愈。

2、方名：避疫特效散 范机承

方葯：泔蒼朮五两 羌活二两 川芎二两五錢 法夏一两二錢 柴胡四两 黃芩一两五錢 貫仲一两五錢 霍香一两 防风一两五錢 石蒼蒲八錢 广香八錢 牙皂八錢 枳壳一两五錢 熟大黃一两 云茯苓一两二錢 生甘草八錢 苏薄荷八錢 白細辛八錢 紫油朴一两 桔梗八錢 飞硃砂八錢 公丁香五錢 雄黃八錢

制法：将上葯共为末，瓷瓶收貯，勿使洩气。

用法：用时先将三分吹入鼻中，再以二分半用白开水呑下，如寒先用生姜湯呑下，即告平安。

3、方名：劳伤葯酒方　　　　范机承

主治：腰痛、膝痛、周身痛（劳伤致痛）。

方葯：生地十两　全归四两　川芎一两五錢　骨碎补四两　茅狗脊四两　眞松节二两　五甲皮二两　盐杜仲一两五錢　海桐皮四两　淮牛夕二两五錢　干木瓜二两　桂枝三两　桑寄生四两　川羌活一两二錢　防风一两二錢　苡仁十两　山稜莪朮各二两五錢　制乳香沒葯各二两五錢

用法：用高粱酒泡或米酒泡，要泡滿49天，方可开始服。

服法：每天只可服一次，至多只能服一两为度（須睡时服）。

禁忌：房事三星期。

附註：只可連服三天。

4、主治：痧症（俗名耗子鉆筋）

方葯：黑猫骨头煅存性

用办：大人每次服五錢，小儿減半。

5、主治：不符水土　　　　顧仲培

方葯：家乡土（即将在家乡穿过的鞋底上括下）

客地土（即在所住地取）

用法：将上葯攪拌澄清，水煎温服。

6、方名：保安万灵丹　　（洪氏本）楊紹昱献

主治：大痲风　痈疽　疔毒　对口　发頤　风寒湿痺　湿痰　鶴膝　左癱右瘓　口眼歪斜　半身不遂　血气凝滞　疝气偏墜　破伤头风　牙关紧閉　截

解风寒　应效无穷

方药：茅山蒼朮　蔴黄　羌活　荆芥　防风　北辛　草烏　川烏　川芎　石斛　全蝎　当归　天蔴　雄黄　首烏　甘草

用法：上药共为細末，蜜丸砯为衣，葱白九茎，煎湯調服，得汗为癒。

7、主治：周身突患风斑发痒　蔣远謀

方药：紫背浮萍五錢　蛇床子三錢　鹤虱五錢　荆芥三錢　防风三錢

用法：泡燒酒六两等二小时后，每两小时服一酒杯，服四次，其余作外用，以棉花擦。

附註：服后其毒自散，其痒立止。

8、主治：老人便秘　蔣远謀

方药：熟大黄二两　白蜂蜜四两　杜仲粉二两　人乳四两

用法：大黄研末加人乳炼蜜为丸，如綠豆大，再上杜仲粉为衣，每服三錢，开水吞下，飯前服。

9、方名：八宝紅灵丹　（洪氏本）楊紹昱献

主治：九种心疼　霍乱吐瀉　小儿急惊　五痨五劳　痈疽疔毒　疮疖　无論男妇老幼均效。

方药：明雄飞　砯砂飞　礞石煅　硼砂　火硝各六錢　麝香　冰片各二錢　佛金40張　共研細末

制法：用酒姜杆汁为丸，如梧桐子大，磁瓶收貯，勿泄气。

用法：量人大小虚实及病情輕重，成人用3——5丸温水送下。

暴病可用淨水化开、擦牙、点眼角，再內服此丸

有效。

10、主治：大便火結　　　　　　　　　　蔣远謀

方葯：生熟大黃各二两　干泡姜各五錢　枳壳二錢

牙硝水一斤（二两牙硝十四两水）巴豆仁白粒

用法：先将大黃姜、枳壳、巴豆（去油）研末，用硝水和为丸，露干卽成。

大人服三丸（豌豆大），青年体壮者服四粒。

禁忌：虛弱老人小孩忌服。

[illegible] [illegible]

婦　　科

（妇經）

1、主治：停經

方葯：小木通二錢　泽兰二錢　紅花二錢　鉄扫帚二錢　酒

服法：生搗冲酒服。

2、主治：經期短

方葯：熟地二錢　当归二錢　白芍錢半　丹皮錢半　元参錢半　寸冬錢半　陈皮錢半　杜仲炒一錢

服法：水煎服。

禁忌：生、冷。

3、主治：經期长

方葯：熟地三錢　当归二錢　白芍錢半　丹参錢半　吳于錢半　白朮二錢　香附二錢　川芎二錢

服法：水煎服。

禁忌：生、冷。

4、主治：經水欲来作痛

方葯：当归　玄胡醋炒　沒葯去油　各等分

服法：上葯共研为末，每服二錢，日服二次，黃酒送下。

5、主治：經閉（經久不行，腹內疼痛，症瘕成块）

方葯：当归　川芎各四两　白芍炒三两　茯苓　陈皮三两　香附米醋炒四两　吳于泡去苦味四两　胡索三两　丹皮三两　小茴盐炒二两　砂仁二两

服法：水酒同煎，早晚空心服。

6、主治：調經（不对月者）

方葯：熟地　酒芎各五錢　当归四錢　香附　陈皮　丹皮　枣皮　胡索　云苓各三錢　生姜三片

服法：水煎服。

禁忌：生、冷、辛物。

（以上六方系郑氏本、郑盛文献）

7、主治：妇女隔經　楊巨源

方葯：生漆树上所生菌子

服法：一次用一錢——二錢，吞酒服。

8、主治：妇女經事先期热症　量少色黑　小腹痛　煩燥　脉弦　乳跳　李伯銘

方葯：柴胡　白芍　青皮　白朮　茯苓　当归　法下　薄荷　甘草

服法：水煎服。渴加花粉　閉塞加紅花　黃芩　生地　广皮

9、主治：經水后期寒症　貧血　头暈　兼白带色淡　腹痛　或脹　李伯銘

方葯：阿胶　肉桂　丹皮　白芍　法下　寸冬　妁姜　吳于　陈艾　附片　甘草

服法：水煎服。

10、主治：妇女倒經　李伯銘

方葯：玉京末　韮菜汁　姜汁

服法：童便冲服。

11、主治：妇女月經不調　一身腫痛　李中品

方葯：鹿角霜四錢　当归二錢　麦芽二錢　甲珠三錢　黑豆三錢　玄胡三錢　羌蔚子二錢　查炭三錢

服法：水煎早晚服。

12、主治：老年經水不断　及血崩　支竹舫

方藥：黃芪八錢　龙眼肉廿粒　紅枣廿个

服法：水煎服，代茶飲。

13、主治：月經不調　經来不止　經后腰痛　　　辜勢超

方藥：生扯攏三两（用鮮的）益母草四錢　紅糖二錢

服法：水煎，临睡时服。

14、主治：經闭　　　　　　　　　　　　支竹舫

方藥：山查四两研末　砂糖一两

服法：每服三錢，白开水送下。

15、主治：产后三年　月經未行　便淋如割　　　方燕宾

方藥：生地三錢　枣皮三錢　淮山三錢　茯苓三錢　木通二錢　当归二錢　滑石二錢　寸冬三錢　淡竹叶一錢　細辛一錢　草梢錢半

服法：水煎服。

（种子）

1、主治：久不生育及腹痛

方藥：蘄艾三錢　苏叶三錢

服法：水煎，黃酒調服，每日二次，空心服。

2、主治：种子

方藥：益母草八两　川芎一两　赤芍一两　当归二两　广木香八錢　生地一两

制法：蜜制为丸，如梧桐子大。

服法：每服五十丸，每日早晨用酒、童便空心送下。

3、主治：种子

方藥：当归三錢　川芎二錢　紅花二錢　黑姜一錢　杭芍二錢　焦朮二錢　广皮一錢　青皮二錢　小茴二錢　砂仁一錢　肉桂五分　玄胡二錢　烏藥一

錢　荆芥二錢　益母三錢　炙草一錢　大枣三枚
生姜三片　甜酒一杯

服法：水煎服，月服三剂，連服三月。

（以上三方系郑氏本、郑盛文献）

（崩带）

1、主治：白带　　任紹华

方药：白折耳根

服法：熬甜酒吃。

2、主治：血崩（腹泄、手足麻木、头暈，不省人事）

方药：用老公鸡一支

用法：将鸡头去掉，将鸡頸塞入阴道約30分鈡取出。精神漸复原状，即愈。　　宋元明

3、主治：紅崩白带　　封藻华

方药：鸡冠花五錢（紅崩用紅、白带用白）小茴三錢
陈棕皮一二四（燒灰）

服法：熬甜酒吃下即止。

4、主治：血崩　　陈德俊

方药：絲瓜燒存性　陈棕燒灰

用法：每次开水送服三錢，連服二天，一日三次。

5、主治：带症　　顾仲培

方药：以异功散为主，加扁豆　淮山　泽泻　苡仁
带下青色：加柴胡　山梔
带下黄色：加石斛　荷叶　陈米
带下赤色：加丹参　当归
带下白色：加苡仁
带下黑色：加杜仲　續断

若內有熱：加黃柏　蓮米

服法：水煎服。

禁忌：生冷。

6、主治：紅崩　諸葯无效　血暴下不止　　　凌云标

方葯：漆壳（盖漆紙壳）一块煅成灰

服法：每次服一錢，白开水吞服立止，連服三次卽愈。

（胎产）

胎产

1、主治：孕妇胎痛

方葯：当归一錢　川芎一錢　酒芩二錢　阿胶二錢　香附二錢　玄胡八分

服法：水煎服。

2、主治：孕妇腹痛嘔吐

方葯：熟地　酒芍　云苓　陈皮　酒芩　砂仁　卜黃　甘草　藿香　苏梗　灯芯　煨姜

服法：水煎服。

3、主治：孕妇小便不利

方葯：杏仁去皮尖面炒黃七粒

服法：研細水調服。

4、主治：孕妇大便閉

方葯：当归　川芎酒炒　生地　枳壳　黃連酒炒各一錢

服法：水煎服。

5、主治：孕妇痢疾

方葯：当归三錢　白芍酒炒三錢　白朮土炒三錢　白茯苓三錢　泽泻二錢　木通二錢　槟榔三錢

黄連炒二錢　黄芩炒三錢　甘草二錢

服法：水煎服。

6、主治：妇女泄泻

方药：泡参三錢　白朮土炒三錢　干姜炮二錢　炙草二錢　砂仁炒一錢　肉蔻煨一錢

服法：水煎服。

7、主治：孕妇腹痛

方药：砂仁炒一两　条芩酒炒一两五錢　白朮土炒一两

服法：上药研細，每服三錢，日服二次，苏梗熬水送下。

8、主治：孕妇胎动

方药：藿香三錢　豆豉二錢　阿胶五錢

服法：水煎服。

禁忌：辛、辣。

9、主治：孕后經来

方药：胶珠二两　川芎二两　生甘草一两　当归三两　白芍四两　艾叶二两　地黄四两

服法：水、酒各半煎服。

10、主治：孕妇因堕墜流血　　陈伯林

方药：北芪三錢　当归三錢　生龙骨五錢　生牡蠣五錢　羌活三錢　生乳香五錢　生沒药五錢　粉草一錢

服法：水煎服，一至五次，服后仰臥，約睡一小时。

11、主治：难产

方药：龟板醋炙一两　当归一两　川芎七錢　人发一团　如蛋大，焙干存性。

服法：水煎服。

12、主治：胎死腹中

方药：黑馬料豆一合

制法：水、童便、各半煎服。

13、主治：产后气痛

方药：茴香根去粗皮　甜酒

服法：茴香根熬甜酒服。

14、主治：产后心痛

方药：桃仁五錢　小茴三錢　紅花三錢　枳壳二錢　陈皮二錢　香附五錢　赤芍四錢　归尾四錢　益母草四錢　紅糖引

服法：水煎服。

15、主治：产后恶露不行

方药：眞蒲黄　五灵脂

服法：煎膏、醋調服。

16、又方：

方药：当归酒洗六錢　川芎四錢　干姜炒黑五分　炙草五分　桃仁五錢　童便引

服法：水煎、冲童便服。

附註：恶露行痛已止，去桃仁。

17、方名：愈风散

主治：产后中风

方药：荆芥穗（不用梗，焙干研末）

服法：每服三錢，童便調服。

附註：如牙关紧閉，可挑开之，或灌入鼻中亦可。

18、主治：难产

方药：当归錢半　芍药一錢　川芎一錢　陈艾醋炒八分　荆芥　羌活　枳壳　厚朴各八分　黄芪二錢　川貝去心一錢　兔絲餅一錢　生姜一片

服法：煎水温服。

（以上八方郑氏本、郑盛文献）

19、主治：难产　　　　　　　　　　　　　　吳玉清

方药：水香蒲（田埂上生的）桃树皮甑底甍三节

用法：水煎服。

20、主治：横逆难产　如遇危急时　寻药不易　　王渊泉

方药：伏龙肝（即灶心土多年紅色者更好）

用法：研成細末，溫酒調服一錢，儿头即带土而出。

21、又方：　　　　　　　　　　　　　　　　王渊泉

方药：黃色葵花子五十粒

用法：焙干連壳为末，調酒服。

附註：以上二方，对偏僻山区，最有用。

22、主治：难产

方药：家兎皮燒灰

用法：每次服五分，开水吞服，即可轉为順生。

23、又方：以产妇自己头发入口中含片时，胎即下。如不下，皂角煅灰吹入鼻孔，得嚏后，即可順生。

（以上二方系張耀奎献）

（乳疾）

1、主治：乳痛　　　　　　　　　　　　　　陈德俊

方药：生蒲英四两

用法：煎水兌酒服，并用渣敷患处。

2、主治：乳腺炎　　　　　　　　　　　　　王国圣

方药：蒲公英　苞谷須　皂角刺尖七个

服法：水煎服。

外用：蒲公英叶（多数）加入大黃　馬齿莧　三味捶烂，兌桐油調匀敷患处，数次即愈。

3、主治：孕妇乳痈（內吹）　　　　王国圣

方葯：皂角燒存性，研細末。

服法：每次服葯末五分，酒送下，二三次即愈。

4、主治：下乳方　　　　陈茂恒

方葯：大种鵝儿腸

服法：燉鸡吃。

5、主治：乳腺炎　　　　李正明

方葯：鹿角末五分

服法：每日二次，連服三次，甜酒冲服。

外用：鮮銀花根　何首烏叶搗烂外敷（可消肿止痛）。

6、主治：乳痈　　　　張　群

方葯：散血草　甜酒糟

制法：将上葯搗絨，焙溫包扎患处。

7、主治：发奶（在生产后数日內无乳，服之有效）

方葯：当归一两　黃芪一两　党参一两　阿胶一两　白朮四錢　杭芍三錢

服法：水煎服。

8、主治：回奶　　　　李世凱

方葯：皮硝一斤　研成粉　分两包

用法：水調敷在两奶头上二十四小时。

9、主治：乳痈（外用）　　　　王銀臣

方葯：地龙

用法：搗絨包患处。

附註：二三日后改用五皮风嚼絨，包周圍，留疮口。

10、又方（內服）：　　　　王銀臣

方葯：泡参五錢　雪里箭五錢　五甲西五分　一扫光五錢

服法：水煎服，一日三次，每次半碗。

附註：服葯后可能发現軟、吐，須吐方好。

11、又方：（外用葯酒） 王銀臣

方葯：地虱二錢　手镯虫二条　蜈蚣二条　烏头二两

土酒斤半

用法：先打瓦針，后用火罐，再用葯酒搽。

12、主治：回奶 楊紹昱

方葯：生麦芽二两

服法：水煎一次服。

13、主治：产后无奶或少 支竹舫

方葯：黄芪一两　当归五錢　白芷一錢　七眼豬蹄一付

制法：熬豬蹄成湯，取湯三大碗，慢火煎成一碗，吹去浮油，入前葯煎至一茶杯。

服法：以煎好之汁溫服，服后即睡，隔一二小时再服，二三次有奶。

14、主治：乳痈及一切乳肿 黄昇阳

方葯：鮮蔴根　活蚯蚓

用法：用上葯捶絨敷患处，潰用紅升丹，外貼生肌膏。

15、主治：乳痈 陈德俊

方葯：卜公英（鮮四两、干二两）銀花五錢

制法：搗汁合水，酒半杯冲服，渣捶絨敷患处。

16、主治：吹乳 凌云标

方葯：白芷三錢　貝母三錢研末

服法：开水送下，每服五分，一日三次。

17、主治：乳痈 王平洲

方葯：五月棕叶燒灰

服法：酒服二錢　連服三次。

18、主治：吹乳　　　　　　　　　　　　　王平洲
方药：苞谷須
服法：水煎服，数次即愈。

19、主治：乳痈（乳头結块，局部紅肿，疼痛，发热恶寒）
方药：鯽魚三至五条、重症可用十余条
用法：将鯽魚破开去腸杂，乘热貼痛处，待魚干燥，再貼，如此更换。　　　　　　　　陆玉成

20、主治：乳花
方药：金銀花　貝母　花粉　半夏　川甲　尔香　皂角刺各等分
服法：水煎服。

21、主治：小儿吹乳初起
方药：絲瓜壳煅灰
服法：甜酒送下，每日三次。

22、主治：乳头肿痛
方药：鹿角灰研末　酒
服法：調酒服，外用葱白搗敷。

23、主治：乳汁不通
方药：瓜蔞仁打碎一个　归尾一錢　甘草一錢　穿川甲炒成珠一錢　乳香去油五錢　沒药去油五錢
服法：水酒各半煎服。

24、主治：乳岩
方药：生蟹壳　沙鍋內焙干
服法：每服二錢，开水送下，不可間断。

25、主治：乳岩已破
方药：荷叶蒂七个燒灰
服法：上药研細，酒送下。

26、又方：

方葯：貝母　核桃隔　金銀花　連翹各三錢

服法：水煎服。

27、方名：通脉散

主治：乳少无乳

方葯：黄芪一两五錢　当归七錢　通草片一錢

服法：燉豬前蹄服。

（以上八方郑氏本，郑盛文献）

（杂病）

1：主治：妇女子宫瘤肿、断經、有卓效。　王銀臣

方葯：桂枝　茯苓　赤芍　桃仁　丹皮

用法：煎剂丸剂均可。

2、主治：不孕　白兴安

方葯：三白根　月月紅　小血藤

服法：和蜂糖蒸吃。

3、主治：不孕　伍紹华

方葯：艾三柯　韮菜根　何首烏　胡椒七顆　笔筒草

服法：煨鸡吃，經后半夜服。

4、主治：妇人阴中痒如虫行　楊紹昱

方葯：黄芩四錢　黄連二錢　生地六錢　杭芍四錢　当归四錢　川芎一錢　苦参五錢

服法：水煎溫服。

外用：虱床子煎水洗。

5、主治：阴唇肿（口渴、心煩、小便滞濇）　楊紹昱

方葯：柴胡三錢　当归五錢　杭芍五錢　白朮三錢　云

芩六錢　梔子四錢

服法：水煎溫服。

禁忌：燥辣。

6、主治：隔經癆（面目指甲均黃、嗜酸、怕油）

方葯：芋藿苏一两　五甲西五分　无虫草一两　党参五錢　泡参五錢　白烏骨鸡一支（金胸綠耳更佳）

用法：将葯洗淨，入鸡肚內燉服（去渣）。

禁忌：服后忌盐，改用秋石。　　王銀臣

7、又方：服前方后，接服本方。

方葯：散血草五錢　雪里箭五錢　党参一两　玉藿苏一两　五甲西五分

用法：水煎服。　　王銀臣

8、三方：服次方，接服此方。

方葯：大鵝儿腸根一两　玉藿苏一两　泡参一两　五甲西五分

服法：水煎服。連服数剂，已好为度。

附註：服后要发軟一天多，病三月者須半月方能治好。半年以上者，須五十天。　　王銀臣

9、主治：干癆（咳半声嗽，心胸及小腹飽脹，腰疼，經脈不通，嗜香物）

方葯：川芎五錢　散血草五錢　岩白菜五錢　泡参五錢　地串白根五錢　五甲西五分

服法：水煎服，日三次，每次一碗，連服二剂。

附註：服后須口不渴，有津液，大便暢，接服次方。

10、二次方葯：玉藿苏一两　泡参一两　党参一两　岩白菜一两　五甲西五分　豬肉半斤

用法：将葯燉肉去渣，日服二次。

附註：服后不发热，大便暢，可連服二剂，如仍口渴，
大便結，应改服下方。

11、三又方：串珍草一两，雪里箭一两　車前草根一两　五甲西五分　王銀臣

服法：水煎服，一日三次。

12、主治：妇人风气（麻木、軟筋、惊风、順筋风、半边风、发热、口渴、大便干結）　王銀臣

方葯：雪里箭二两　五甲西一錢　串珍草一两　地串白根一两

用法：水煎服，一日三次。

附註：五十、六十岁，不宜用五甲西。

13、又方：不能起床者，服此方。　王銀臣

方葯：五甲西一錢　泡参一两　无虫草二錢　党参一两　地串白根一两　豬肉半斤

用法：将葯燉肉加盐去渣，空心服，連服五剂，日一剂。

附註：服后可能发現足軟、头脹、眼脹等反应。

14、又方：寒性身肢发冷　王銀臣

方葯：寸金草五錢　大鵝儿腸根一两　五甲西一錢　党参一两　泡参一两　无虫草一两　鴉一支

用法：葯洗淨，鴉去腸杂，将葯装入肚內燉服，不要渣。

15、主治：妇人阴戶內痒　蔣远謀

方葯：水岸板草五錢　虱床子五錢　苦参根一两　枯矾一錢　雄黃末三錢

用法：熬水洗患处。

16、又方：煅石燕一两　磨刀石浆一两　淨輕粉一两　梅片一錢　活虱五錢　蔣远謀

用法：上葯共研細末，桐油調匀，用棉花粘葯入阴戶內。

儿　科

（痲疹）

1、方名：防治痲疹　　　　　　　　楊紹昱
　方葯：銀翹散75%紫草散25%
　用法：二葯合为一处，按小儿年龄計，每岁用二分。

2、主治：痲疹出后　凝集皮下不散　外症发热气喘
　　　　　　　　　　　　　　　　楊紹昱
　方葯：白兎血
　服法：取白兎一支刺耳下出血，取数滴冲燒酒及开水适量服。

3、主治：痲疹初期到恢复期及合并肺炎，三方　　李伯銘
　方葯：①、初期：銀花　連翹　荆芥　大力子　杏仁
　　　　　　大青叶　紫草根　芦根　甘草

4、　　②、恢复期：当归　生地　寸冬　赤芍　焦谷芽
　　　　　　玄参　木通　竹叶

5、　　③、合并肺炎症：痲黃　杏仁　石羔　浙貝　兜鈴　瓜蔞子　天竹黃　芦根

6、主治：預防小儿痲疹　　　　　　邱志明
　方葯：苦練子（不拘多少）
　用法：用上葯煎湯洗几次，即可預防。

7、主治：痲疹发后不出　他葯不效　　　楊紹昱
　方葯：生虾十个

服法：将生虾放鉢內乳烂，冲燒酒数滴加开水服。

8、又方：　　杨紹昱

方葯：白公鷄血

服法：取白公鷄一支，刺取鷄冠血数滴入杯中，冲入燒酒数滴，加开水服。

9、主治：痲疹　　薛肇西

①、症状：未出时发現燒、咳至二三日、眼紅、手足冷、大便自泻，

方葯：銀花二錢　連翹二錢　牛子三錢　杏仁一錢　荆芥三錢　薄荷三錢　桔梗三錢　竹叶十張　淡豆豉三錢　甘草一錢

10、　②、症状：手足更冷、咳嗽、不思食、大便虽解不利、人昏迷。

方葯：升痲三錢　葛根三錢　荆芥三錢　杭芍三錢　明粉二錢　大黃二錢

③、症状：痲疹已出，色淡紅、面唇白、舌白潤咳，气喘、神衰、手足冰冷，

方葯：熟地六錢　白附三錢　桂枝三錢　白朮三錢　枣皮二錢　升痲三錢　当归三錢　紅花三錢　故子三錢　枣五枚　姜三片

（惊痫）

1、主治：慢惊腸泄　　楊紹昱

方葯：胡椒三錢　母丁香三錢　炮姜四錢　肉桂五錢

用法：將上葯研末，用灶心土煎水吞服，一岁每次服五分。

2、主治：小儿臍风

方藥：新生儿落下臍帶二分之一焙枯研末，硃砂五分飞去銀皮研末蜂糖二錢調匀上葯

服法：将上葯分三次服，每日一次，服三日，（搽在大人乳头上，小儿吃乳服下）。

3、方名：治小儿惊方　　王国圣

主治：小儿发惊

方葯：馬脚泥（馬蹄壳內自落的）

服法：泡开水喝。

4、主治：小儿急惊风　　向泽民

方葯：全虫一两　胆星一两．硃砂三錢　桊菔子二錢　巴豆霜二錢諸葯研合

服法：小儿一岁以內一分　三岁一分半　四至五岁二分半大人中风踤倒，不知人事，昏迷不醒者三至五分，灯心为引。

說明：①小儿服后在十分鈡时，必然煩燥，勿以为异，是葯与病爭，十分鈡后，必吐出风痰三四次，則思睡，睡后則洩出风痰，病卽全愈。

②初生小儿月內惊风或胎毒，用上葯以川連、条芩、竹叶、粉草山梔、灯心为引煎湯送下。

③慢惊忌服。

5、方名：蕩惊散加味

主治：小儿痧疹豆后，气血两虛、夜发、肢厥、面青、吐沫、伸腰、屈腿、指紋細浮如浪发痫

方葯：草烏制二两　上桂一两　胡椒八錢　母丁香六錢　炮姜五錢

服法：共研細末，一岁以下六分三服。

6、方名：老鷹散　　楊紹昱

主治：小儿暴染急症面赤目定口呆
方药：老鹰爪一双（取至膝），飞辰砂一錢，共研細末
用法：一岁以下服二分，一日三服开水下。

7、方名：預防小儿臍风方　　顾仲培
方药：麝香（取如小米大一粒）（药須先为預备，以便临期应用）
用法：在小儿初生后二三日俟臍带落下，即时用上药塡入臍眼用棉花盖着，束縛寬带勿令脫下。
附註：此方可使小儿不生臍风，且以后不为贼风侵入。

8、主治：慢惊大便溏泄色白、咳嗽、口渴　　楊紹昱
方药：生軍三錢　明粉三錢　炮姜四錢　肉桂五錢　公丁三錢　胡椒一錢
用法：将上药为末，每服六分，一日三次。

9、方名：抱胆丸　　楊紹昱
主治：小儿热癎癎后发狂指紋紅直穿关外目赤面紅有光坐臥不安
方药：水銀一两　黑鉛七錢　硃砂一两　乳香五錢
制法：先将鉛入銚子內，后下水銀、結成沙子，次下乳硃合丸
服法：一岁以下三分。
禁忌：服药后忌惊动。

10、方名：鎮惊散　　楊紹昱
主治：小儿煩惊屈腰乍啼发热面紅舌强不吃乳两目斜視紋紫紅穿关射指
方药：茯神一两　麦冬一两　天竹黃一两　勾籐一两　胆星一錢　辰沙六錢　生远志六錢　石菖蒲六錢　川連六錢　犀角六錢　牛黃六錢　珍珠八錢　粉

草四錢　酸枣炒六錢

制法：将上葯共研細末。

服法：一岁以下六分　分三次服，痰鳴嘔吐者姜湯送下不吐者竹叶湯送下。

11、方名：大青膏散　　　楊紹昱

主治：小儿发痫直視肢厥面赤唇青搖头踡指便迫目定口呆紋沉

方葯：天麻六錢　附片四錢　青黛二錢　全虫二錢　硃砂二錢

竹黃四錢　烏蛇肉二錢　麝香五分　共研細末

服法：一岁以下三分，分三次服，发拘攣者勾籐湯送下无則用薄荷湯送下。

12、方名：硃衣滚痰丸

主治：小儿声洪亮睡覚冲枕数日发痫痰壅喉中四肢逆气促昏倒

方葯：大黃四两　黃芩四两　礞石五錢（火硝煅）　沉香三錢

制法：先研礞石、后合研細末，

服法：一岁以下二分，三服，溫湯送下。

13、方名：烏头桂枝散

主治：小儿阴寒发痫囊縮子走入沙腹紋細弦直面白唇青

方葯：烏头一两　桂枝一两五錢　杭芍一两五錢　炙草一两五錢　共研細末

服法：五分三服，左子上升加荔枝核，右子上升加盐木香，煎水服。

14、主治：小儿痰痫夹惊角弓反張身热肢厥汗出

方葯：生川烏五錢　生半夏五錢　白僵蚕五錢　燒鉄落

片四錢　全虫二錢　甘遂二錢　麵煨

服法：共研細末，一岁以下二分，三服，开水送下。

禁忌：甘草。

15、方名：玉眞散　　　　　　　　　楊紹昱

主治：膝风口眼歪斜角弓反張

方葯：天麻一两　羌活一两　防风一两　南星（生）一两　白芷一两　白附片十两为細末

用法：一岁以下每服三分，姜湯送下。

16、方名：藤蛇散　　　　　　　　　楊紹昱

主治：急惊指紋穿关射甲吐泻面紅

方葯：全虫（去头足）五錢　勾藤五錢　硃砂四錢　龙衣三錢共研細末

服法：一岁以上服三分，三次服。

17、方名：烏金散　　　　　　　　　楊紹昱

主治：四肢反折面青口閉

制法：烏鴉一支，用罐置炭火煅，硃砂五錢，共为細末。

用法：一岁以下每服三分，一日三服。

18、方名：蕩惊湯　　　　　　　　　楊紹昱

主治：慢惊吐泻便白肢冷角弓反張

方葯：綠水桂五錢　母丁香三錢　附片五錢（熟）炮姜三錢　共研末

用法：一岁以下服三分，一日三服。

19、主治：痴呆有痰火者　　　　　　蔣远謀

方葯：礞石滾痰丸四两

用法：日服三錢，飯后服。

附註：服后吐痰容易，大便夾痰。

禁忌：豆浆。

（百日咳）

1、主治：百日咳

橘紅二錢

服法：水煎服，一岁至三岁分三次服，四岁至六岁分二次服，七岁至十岁一次服。

2、主治：百日咳（痙攣期有效）　　　　吳継歧

方葯：蜜桑皮五錢　甜葶藶二錢　車前子二錢　竹茹一錢

服法：水煎服。

3、主治：百日咳　　　　支竹舫

方葯：枇杷叶（洗淨去毛用鍋炒干）三錢

制法：用开水煮开五分鈡，濾去渣。

用法：二小时服二次。

4、主治：小儿百日咳　　　　楊紹昱

方葯：生半夏（研为細末，水泡21日，三日一換水，阴干后再研細末）川黃連（研为細末，用量照半夏末加倍用）

服法：每日三服，每服六厘（一至三岁小儿量），开水送下，三岁以上加倍用，亦可用胶囊盛服（但須小儿体实面赤者可用虛弱者愼用）。

（喘咳）

1、方名：連夏散　　　　楊紹昱

主治：小儿哮喘喉紧气促发热面赤唇紅舌赤

方葯：生半夏一两　枳壳三錢　云苓一两　芒硝三錢　川連二两五錢　共为末

用服：一岁以下每服五分，一日三服，开水下。

2、方名：麻玉散　　　　　　　　　　　楊紹昱

主治：小儿哮喘面赤唇紅舌干大赤大热惊悸

方药：麻黄一两　石羔三两　杏仁两半　粉草二两　射干七錢

制法：先将麻射草三味煎水，濾过加入杏仁石羔末收干。

用法：一岁以下服四分。

3、主治：儿童久咳身体瘦弱半声咳嗽　　　　顾仲培

方药：茴香虫（在茴香杆上或从叶上找，找着必一对单的不用）

制法：炕干研为細末。

服法：将药末一次或二、三次服完，以白开水送下，服一对至三对即愈。

4、方名：半夏散　　　　　　　　　　　楊紹昱

主治：小儿痰喘如鸡声大便燥小便黄少

方药：生半夏去皮二两　枳壳五錢　云苓二两　芒硝五錢　为細末

用法：一岁以下服三分，淡姜湯引。

5、主治：水喰肺成热咳　　　　　　　　王銀臣

方药：泡参五錢　串珍草五錢　无虫草五錢　川芎二錢　回香根二錢

用法：水煎服，每日二次，每次半碗。

附註：如不效加泡参五錢　党参五錢　五甲西五分　地串白根五錢用豬脚加盐燉，取湯服，每日二次，每次一小碗，如不見效續服二剂，每三日一剂。

6、主治：水喰肺小冷咳（不发热气满）　　王銀臣

方药：无虫草五錢　泡参五錢　党参五錢　地串白根五

錢　五甲西五分　子鴉一支

用法：将鴉去腸杂，以葯放鴉肚内燉熟，服肉及湯，每服一小碗，一日二次。

附註：服后可能发軟嘔吐，如有食、有气，須得吐为佳，如再不好，不用鴉改用豬肉半斤煨葯吃，大人亦可用，葯量酌加。

禁忌：服葯后，忌食豬头肉、雄鴉肉、笋子、粉条、甜酒粑粑、酸冷等物。

（疳积）

1、主治：百虫吃肝　　　　　　　　　　張琼

方葯：牙皂一个（折断）羊肝二两　地于荚盖根（草葯）二分

服法：放油盐合葯蒸吃（葯渣不吃）。孩子小的吃后泻二次，即愈。

2、主治：小儿久病成劳、瘦削无肉　　　　　邓德光

方葯：人乳四两　蜂糖四两　童便一杯　三味熬成膏

服法：早晚每服一湯匙。

禁忌：燥火、硬食及葱。

3、方名：疳积方　　　　　　　　　　李登邦

主治：小儿疳症

方葯：牛茅草（生在田里最矮）豬肝或鴉肝

服法：用上葯同肝蒸吃，三次即愈。

4、主治：小儿疳积

方葯：酸石榴皮（去粗皮不用，每用三两）白糖适量

服法：用水蒸上葯，加入白糖，每日二三次服。

禁忌：煎炒。

5、主治：小儿口内生白疳　　　　　　　　　簡叔平
方葯：芙蓉花（无花可用叶或根）搥烂
用法：鸡蛋清攪匀和葯揑成餅二个，放鍋上焙，于臍眼心窩各貼一个一夜卽愈。

6、又方：　　　　　　　　　　　　　　　簡叔平
方葯：活泥鰍一尾（以草米心穿顋，放清水中擺淨）
用法：用手提住草米心，将泥鰍放儿口內任其蹦跳片时取下，数次卽愈。

7、主治：小儿疳积　　　　　　　　　　　楊紹昱
方葯：炉甘石六錢　赤石脂五錢　滑石五錢　石决明八錢　硃砂四錢　胡黃連四錢　青黛三錢　珍珠三錢亦可治眼病
用法：小儿一岁以下服二分，蒸鸡肝服，成人酌加。

（泻痢）

1、主治：小儿乳痢色綠面黃　　　　　　　楊紹昱
方葯：黃芩三两　公丁一两五錢　共为末
用法：一岁以下每服六分，一日三服。

2、主治：小儿下痢煩惊顏面乍赤乍青四肢乍冷紅多白少。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楊紹昱
方葯：人熊胆一錢　川連二两　黃柏酒炒一两五錢　黃芩二两五錢　硃砂三錢飞　共为末
服法：一岁以下，三分，分三次服，苦竹湯送下

3、方名：理中散　　　　　　　　　　　　楊紹昱
主治：小儿久咳吐泻不止昏迷思睡指紋沉
方葯：米参五錢　焦朮一两五錢　大粉草一两半　均姜二两共为末

用法：一錢三次服。

4、主治：小儿水泻　　　　　　　　　　　　黄一成

方葯：陈茶叶車前仁生姜煎服

剂量：以儿年龄定之。

5、方名：玉液散　　　　　　　　　　　　楊紹昱

主治：小儿便溏恶心嘔吐而不出昏迷煩渴小便少暑月多此症

方葯：煅滑石四两　母丁香三錢　广藿香三錢

用法：将上葯幷研細末五分（三次服），燒盐湯下。

6、方名：縮脾飲　　　　　　　　　　　　方燕宾

主治：小儿吐泻或干嘔下泻

方葯：草果仁一錢　砂仁一錢　扁豆錢半　粉葛錢半　甘草一錢　烏梅二个

禁忌：生冷不消化食物、油。

7、方名：六一散加減　　　　　　　　　　楊紹昱

主治：阴霍乱小儿泻多吐少身不热口渴便白昏迷脉沉細紋在初关

方葯：煅滑石二两五錢　石硫磺（先用豆腐煎三次）一两共为末

服法：一岁，五分，分三次服，粳米湯下。

8、方名：香連散　　　　　　　　　　　　楊紹昱

主治：小儿下痢赤白裹急面紅口渴紋紫

方葯：川連吳于炒三两　青木香一两　共为末

服葯：一岁以下六分，分三次服，槐花湯送下。

9、主治：先服理中散嘔止四肢不溫

方葯：附片姜汁炒一两五錢　焦朮二两　米参六錢　炙草一两五錢共为末

用法：一日一次温服。

10、主治：小儿赤白痢　　　　　　　　　　王銀臣

方葯：地馬风五錢　枣耳黄五錢　瓦耳糖五錢

用法：先用前二味熬水，再用瓦耳糖和匀蒸服，三岁至五岁每日服三匙。

11、方名：归龙散　　　　　　　　　　　楊紹昱

主治：小儿冷熱不調泻痢不止

方葯：龙骨煅一两　川連炒一两　枯矾五錢　白石脂五錢　当归五錢　干姜五錢　共为末

用法：一岁以下服四分；二岁以下服六分。

12、方名：枳实理中丸　　　　　　　　　楊紹昱

主治：病势已减腹脹滿者

方葯：枳实炒一两　炮均姜一两　米参六分　炙草一两　焦朮二錢

用法：共为細末，一日一錢，五次服。

（脱肛）

1、主治：小儿脱肛　　　　　　　　　　李鎮平

方葯：蓖麻子三錢

用法：将上葯燉豬大腸服，另用蓖麻子搗研出油涂敷肛門。

2、主治：小儿肛門脱出　　　　　　　　聶华彬

方葯：白矾研末

用法：将上葯末搽肛門，永不再脱。

3、又方：

主治：小儿脱肛久不收者　　　　　　　聶华彬

方葯：葱一斤（全棵）五棓子

用法：用上葯煎湯倒入桶內，坐上乘热薰之，随后慢慢洗軟，用五棓子为末，鋪紙上卷成筒，燒燃放便桶內，令其坐上，使烟气薰入肛門，后用白温水洗自愈。

（虫症）

、方名：杀虫散　　　　楊紹昱

主治：小儿虫积发痫眼皮青黄两耳黑亮有光腹硬便溏唇紅舌板苔生圈紋臍腹凹凸心煩吐青水发痫服过烏梅丸不效者服此散

方葯：烏头二两　桂枝一两五錢　胡連一两　川[illegible]八錢　生軍八錢　粉草四錢　胡椒五錢　杭芍一两　均姜一两

服法：共研細末，一錢三服，下虫为驗。

2、主治：肛門燥痒难忍，口唇黑，大便溏　　　　楊紹昱

方葯：生地六錢　杭芍四錢　川芎一两五錢　秦艽三錢　鶴虱四錢

服法：水煎溫服。

禁忌：辛辣。

3、主治：肛門有寸白虫出　　　　楊紹昱

方葯：胡黃連二錢　川楝子三錢　酸石榴皮四錢　石决明煅三錢　川黃連一錢五分　赤石脂二錢醋煅

服法：煎水服。

禁忌：香燥物。

4、主治：腹痛背痛陣发性恶心嘔吐蛔虫　　　　李世凱

方葯：烏梅五个　使君子三个　檳榔三錢　茯苓三錢　厚朴三錢　甘草二錢　大枣六錢　或加鶴虱

服法：水煎服。

5、主治：蛔虫、寸白虫、蟯虫。　　王渊泉

方药：百部适量

用法：水煎服。

6、方名：打虫散　　楊紹昱

方药：楝树根　梹榔　鶴虱　蕪荑　錫灰　石榴根

用法：将上药共研为末，五更时葱湯送下

（杂症）

1、主治：小儿童子痨　　王平州

方药：人龙十二条（蚘虫）　紅枣三十个　菜菔子錢半　熟地五錢　眞藕粉一两五錢　川連六分

制法：将人龙洗淨，瓦焙勿令黑，研末，紅枣不破，飯上蒸熟，去皮核，菜菔子藕粉、川連（酒拌炒）共为末，熟地杆成膏，将紅枣肉熟地膏和諸药末搗匀为丸梧桐子大，每早以开水送下七丸，逐日加增二粒至二十一粒为止，服完一料全愈。

2、主治：治小儿退㬠　　汪黃氏

方药：生姜　食盐　揚尘

用法：用生姜蘸食盐揚尘搽头额，四肢及胸背等处。

3、主治：小儿夜睡遺尿在床　　黃一誠

方药：复盆子　补骨脂

用法：水煎服，剂量以小儿年龄定之。

4、方名：針治肿舌风　　楊紹昱

主治：嬰孩舌如大人，伸出口外

取穴：太冲

手法：透天凉一进三退　針后即能吸乳。

5、主治：小儿肢体屈侧（腋下胯窩等处）紅末皺烂

方葯：菜油一錢　樟脑二分　　　　　　　呉継歧

用法：二味融化，搽患处，另以滑石粉掺之。

6、主治：小儿发痧气滞、絞腸腹痛　　　　顧仲培

方葯：弦綫（土法紡棉紗車上用的，此弦曾拖过黃醋）

用法：将上葯煅成灰，用酒或开水吞服。

7、主治：小儿吐奶　　　　　　　　　　　支竹舫

方葯：姜汁

用法：每用一二滴，用白开水冲服。

8、主治：小儿胎毒　热毒　泡疮等症　　　方燕宾

方葯：紫苏叶　芝麻油

制法：将紫苏炕干研末，用麻油調搽患处。

說明：能止痛止痒，重則三次，少則一次，即收而愈。

9、方名：加味磁硃丸　　　　　　　　　　楊紹昱

主治：两目昏花，神水不足

方葯：珍珠豆腐蒸一两五錢　硃砂一两　神曲三两　磁石煅二两　蜜丸

用法：一岁以下每服三分，日服三次。

10、主治：喉痛　　　　　　　　　　　　王云臣

方葯：一扫光二錢　雪里箭二錢　前胡三錢　五甲西五分　車前草根二錢

用法：煎水服。

附註：乳儿由大人哺喂三口。五至八岁酌加用。

11、又方：（如服上方未效，再服本方）

方葯：无虫草二錢　串珍草三錢　雪里箭三錢　五甲西五分

附註：服上方后，須隔夜方能服本方。

12、：又方（上方如再不見效改服本方）

方葯：泡参一两 地串白根一两 党参一两 五甲西一錢

用法：水煎服。

13、方名：桊菔散 楊紹昱

主治：气鼓腹大，两脚筋靑

方葯：龙脑三錢 蘿卜九錢 檀香四錢 共为末

用法：一岁以下每服二分，分三次服。

14、方名：牛郎散 楊紹昱

主治：水鼓、腹大、腸鳴面黃

方葯：白丑牛五錢 甘遂五錢 榠榔五錢 共为末

用法：一岁以服一分

15、主治：小孩稀痘疹（一方） 范机承

方葯：甘草一錢 大黃五分 橄欖取汁

方法：在小儿生下地时，接生的人，立馬用頂細白綢一条裹在接生人的小指上蘸葯水（上葯煨好預备再滲入橄欖汁）很快的插入生下地的小孩口中，裹出口中含有的血子和涎，洗过干淨，此葯水可給小孩呑下一点才哭为最好，此后就出痘疹，絕无危險和严重。

16、（二方）： 范机承

方葯：鴙蛋清

方法：小儿初生三天当中，用手蘸蛋清从頸窩第一脊骨揉起至尾椎止，按椎揉到，周而复始，連揉三次必有黑毛出，如发一样，一星期揉一次，連揉三次。

17、（三方）：

方葯：橄欖 糯米 白糖 为末 范机承

用法：将上葯末调匀，每服一錢——三錢（須令熟）每星期吃一次，功能敗毒稀痘。

18、主治：小儿扁白尿　　　　　　　　　　　　　　　蔣远謀

方名：薏苡以二两　生姜二錢　荆芥三錢　防风三錢

用法：先将生姜、荆芥、防风熬水，再煮以仁米，稍放少許块盐服用，早午夜飯前服，或临睡前服。

隊 栈

外　　科

（刀伤）

1、主治：刀伤止血　　　　　　范机承
　方药：切瘦豬肉一片貼上立止
　制法：或燒瘦肉炭，穿山甲炒焦为末，敷上患处。
　又方：月月紅叶　珠兰子叶　构皮树叶
　用法：用口嚼絨敷，更有特效。

2、主治：外伤出血　　　　　　竹支舫
　方葯：烏賊骨（即墨点骨）不拘多少
　制法：研細末，用瓶装好。
　用法：用葯末放于出血处，用布扎好。

3、主治：刀伤止血　　　　　　来源祖傳范机承
　方葯：絲瓜叶打成粉
　用法：将葯放患处包好。

4、主治：指头切掉落地下　　　　　　王国圣
　方葯：糯米草根　見风兰根
　用法：先漱口，将上葯嚼烂，接好断指后，再用絲棉包上，三日內看指甲活否，不活将断指除掉，外用生肌化膿葯敷上即愈

5、主治：刀伤　　　　　　熊秀珍
　方葯：見血飞　魚电根　葡萄根
　用法：內服治伤，外敷刀伤。

6、主治：刀伤流血不止　　　　　　　　　　陈德俊

方药：乳香　没药（去油）　硼砂　血竭

用法：将药研細为末敷伤处。

7、主治：刀伤化膿　　　　　　　　　　　顾仲培

方药：陈肥腊肉　花椒　陈茶

用法：将陈腊肉切片，比伤口大三五分貼上，用消毒棉花盖上，布条扎好，一日一换，换时另用花椒陈茶叶煎水洗，勿冷水浸伤口，洗后揩干，以提滿肉为度。

禁忌：发物，勿动怒和房事。

8、主治：开放伤（即破流血）　　　　　　熊秀珍

方药：洋桃根

用法：捣絨包伤处

9、主治：鎗伤　接骨　　　　　　　　　　楊兴安

方药：（外用）馬蹄菜　骨硬菜　楸树顚　吉苗黄（布依語）

制用：将上药捶烂，包伤处，用夹板裹定。

內服药、泡酒。

方药：爬岩香　爬岩虎　鉆山龙　八瓜金龙　黑骨藤二錢　見血飞　四块瓦　吉苗黄根　骨硬菜根　楸树根　大小血藤　川芎

附註：服药酒，不得超过八錢，每日三次。

禁忌：生、冷、酸。

（此方三代祖傳）

外金伤

10、主治：刀伤血流不止　　　　　　　　陈德俊

方药：陈石灰　荆芥　柏枝　一枝箭

用法：先用小便淋过伤口，将上药研末对蛋清搽。

附註：重者加入乳香、没药、白芷，共搽七日生肌。

11、主治：鎗花　拔取彈头　　　　陈德俊

方药：鹤筋草　透骨草　紫丁香根　当归　自然銅　小路边麻

用法：內吃外敷。

12、主治：刀伤止血

方药：冰糖一两　生白蜡五錢　灯草二錢

用法：研末干涂，血即止。

13、主治：刀伤止血止痛

方药：生半夏一两　花椒五錢　白蜡三錢

用法：研細燒酒調敷

14、又方：

方药：陈蒲扇叶（去筋）　陈棕刷子　以上二味燒灰成性，老松香二两　蘿蔔头燒灰　血蝎　儿茶各五分　麝香一分

用法：研細末涂之，有效。

15、主治：刀伤

方药：千年石灰　輕粉　血蝎　白蜡

用法：将上药研末，摻上太乙膏盖之。

16、又方：

方药：陈石灰研細六两　大黃切香三两

用法：将上药同炒，至石灰色黑，去大黃，留石灰，研末敷上立愈。

17、又方：

方药：鹿角灰　胎发煆　花椒（火焙）　火草　黑姜炭

用法：将上药研細敷上。

18、主治：刀伤止血止痛生肌

方药：用久年汗毡帽燒灰摻上或用久年汗梳子燒灰摻上

19、又方：

方药：生半夏　龙骨　象皮　老石灰　老松香

用法：将松香点燃和上药燒之，滴成珠，研細，兌冰片擦上，立止血止痛，七日生肌。

20、主治：刀伤流血不止

方药：千年石灰　生半夏

用法：将上药研末摻上，血即止。

21、又方：

方药：路边黄（过路黄）

用法：嚼細，敷上有效。

22、又方：

方药：用紅枣去核，搗如泥，敷之即愈。

又方：

方药：二郎箭嚼敷有效。

23、主治：刀伤洗药（断皮用）

方药：臭牡丹叶　毛根一把（去壳）

用法：熬水洗伤口，再用上药。

24、方名：金刀散

主治：金疮脫腐生肌

方药：松香（炼过淨）七两　枯白矾一两五錢　生白矾一两五錢

用法：将上药研細，磁瓶收貯，用时摻患处立效。

附註：幷治痈疽发背，諸般潰烂。

25、主治：箭、签、鏃伤

方葯：陈艾　大蜣螂　火硝

用法：先将陈艾乳成餅，再用火硝末摻上，后用大蜣螂搗細鋪，包在伤处，一日一夜即出。

26、主治：鎗子、針、釘入肉

方葯：用蜣螂研細搽上，候痒为度，即出。

27、又方：

方葯：用莧菜、沙糖合搗成餅，敷上自出。

28、又方：

方葯：活鱔魚尾尖，搗如泥，盖伤处，过夜即出。

29、主治：竹木入肉

方葯：牛夕嚼烂敷自出。

30、主治：刀砍斧伤

方葯：乳香四两　沒葯一两　血蝎一两　儿茶一两　冰片五分　龙骨六分　象皮六錢

用法：将上葯研末，撒刀口上，止血止痛。

31、又方：

方葯：貝母七个　冰片一分　寸香一分　龙骨　象皮　尔香　沒葯　血蝎　輕粉　儿茶　銀硃　明雄　硃砂各一錢

用法：将上葯研为末，黃紙貼上。

32、主治：刀伤断筋

方葯：生半夏六錢　乳香　沒葯各五錢　白芷一两　松香（童便熬七次）八錢　血蜡　龙骨各五錢　、山七二錢　羌活　苏荷叶　儿茶各五錢

用法：将上葯研为細末，調生豬油敷伤处。

33、刀伤潰烂

方葯：夏枯草　七同蒿　生扯攏　滑头草(以上系草葯)

用法：将上葯口嚼敷上。

34、主治：刀伤

方葯：白芷 生半夏 漂硝 老松香 白蜡 火硝 冰片 甘草 桃仁 天南星等各一分

用法：将上葯研細，掺伤口上，即愈。

以上二十一方系郑氏木 郑盛文献）

（跌打損伤）

1、主治：跌扑損伤

方葯：一枝蒿二錢 草烏二錢五分 八爪金龙四錢 矮駝駝八錢 叶上花錢半 骨碎补二錢 飞龙赶血四錢 重楼一两

用法：将上葯共研为末，敷患处，內服五公厘。

2、又方：跌扑損伤

方葯：生附子一两二錢 羌活一錢 生南星一錢 天麻 白芷 防风各一錢

用法：将上葯研細，一次服五分。

3、又方：跌扑損伤

方葯：观音虫三个 一枝蒿五分 地牯牛七个 一顆血三錢 大救駕三錢

用法：将葯泡酒服。

（以上三方陈德俊）

4、主治：車碾伤 王志才

方葯：千千活

用法：搥包伤处

5、主治：跌打損伤 刘文明

方葯：馬前子童便泡四天 露七天热灰炮制刷白 紅牛夕

服法：酒吞服。

用量：成人壮年每次一錢，按强弱加减，灵活应用。

6、主治：跌打接骨　　　　　　　　刘文明

方葯：紅牛夕根　芹菜叶　燒酒

用法：搥絨包伤处，外用夹板包好。

7、主治：跌打損伤　　　　　　　　楊巨源

方葯：滚山豬

用法：酒吞服，有奇效。

8、主治：跌打劳伤　　　　　　　　熊秀珍

方葯：大血屯　小血屯　叶上果　果上叶　乱头发　四块瓦　矮駝駝　打不死

服法：泡酒服，每次五錢。

9、主治：跌打損伤　　　　　　　　楊少邦

方葯：酸米米二两　尿垢一两

用法：将上葯二味混合搥烂，敷貼伤处，三次即愈。

10、主治：破伤风　　　　　　　　范机承

方葯：生南星四两　姜汁炒　防风四两　羌活一两　生附一两

制用：共研細末、淡酒吞下，三次，每次至多二錢，将葯末敷上破处，并治一切破烂。

11、主治：破伤风　　　　　　　　陈德俊

方葯：白芷三錢　甘松三錢　生南星二錢　生半下二錢　生烏头一錢

制用：将上葯研細末，內服一錢五分——二錢，对酒服，視强弱加减，外敷止痛止血，洗淨敷上患处。

12、主治：破伤风　　　　　　　　王平洲

方葯：蟬脫酒炒

服法：兌酒吞服，特效。
附註：外用蜈蚣一条研末、搽牙，追去涎沫，立愈。

13、主治：跌扑損伤　　　　顾仲培
方葯：五加皮四两。雄鸡一只黑者佳
制法：把鸡去毛連肉骨血合上葯搥烂（快速）
用法：将上葯趁温敷患处，包紧一周，即揭去，不可过期，再用五加皮酒、燙热、尽量飲醉，熟睡即愈。

14、主治：跌伤　　　　王国明
方葯：大血屯、千千活
制用：內服大血屯　外用千千活搥包伤处

15、主治：損伤內服　　　　范机承
方葯：当归七錢　川烏二錢　骨碎补一两　續断七錢　火煅花蕊石五錢　酒大黄一錢五分　制乳香四錢　制沒葯四錢　自然銅五錢（研細和葯吞服）月月紅五錢
服法：水煎服

16、主治：跌打損伤
方葯：归尾　紅花　赤芍　羌活　乳香　沒葯　山稜　莪朮　只壳　厚朴　槟榔　肉桂　防己　半夏　川烏　草烏　大黄　碎补　虎骨　紫荆皮　紫草　苏木　吳于　白芷　大茴　小茴
用法：熬水服

17、主治：跌打損伤大便不通
方葯：秦归三錢　赤芍三錢　紅花三錢　桃仁三錢　生地三錢　只壳二錢　龟板醋炙三錢　槟榔三錢　火麻仁三錢　酒軍三錢。
用法：煎水兌童便服。

18、主治：跌打損伤，大小便不通。

方葯：归尾　赤芍　桃仁　大黄　加皮　山七　枳壳

广皮　茜草　牛夕　厚朴　紅花　生地　青皮

木通　莪朮　川芎　山稜　泽兰　苏朮　棕根灰

藕节　桂麻头

用法：将上葯煎水兑酒溫服。

方名：金不換

19、主治：跌打損伤

方葯：洋参　沒葯　沉香　广香　丁香　乳香　麝香

桂皮　冰片　洋桂　砵砂　辰砂　川烏　草烏

升麻　紫絨　大黄　蒼朮　桂枝　白芷　白八爪

金龙

用法：研末兑酒为丸

20、主治：跌打損伤，筋骨疼痛，定痛和血。

方葯：百草霜一两　当归五錢　白芍一两　川烏泡三錢

南星三錢　赤小豆一两五錢　白芨八錢白斂一两

五錢　骨碎补八錢　牛夕六錢

用法：将上葯为末，甜酒糊为丸。如桐子大。

服法：每日30丸，盐湯溫酒吞服。

21、打伤接骨

方葯：茨老包皮　五甲皮　桐子根　側兰　梧桐根皮

山稜　莪朮　元麻头　退血草　牛夕　紅米

用法：用酒炒热，兑鷄蛋一个，包紮伤部。

22、主治：接骨止痛

方葯：川烏　草烏　梔子炒　胡椒　挂面

用法：将上葯共研为末，开水調包伤处。

23、主治：接骨（外敷）

方药：生栀子三錢　桃仁二錢　胡椒二錢　五甲皮三錢
豬苓草三錢　灰面炒四两或加鮮艾　鮮葱

用法：将上药共同搗烂，敷伤处

24、主治：跌打骨断

方药：赤葛皮　赤葛

用法：先用赤葛皮搗烂，每服二錢，酒吞下。后用赤葛搗烂包紮伤处。

25、又方：

方药：紅浮萍　姜汁

用法：将上药搗烂如泥，包紮伤处，其骨自接。

26、主治：閃拗手足

方药：生姜　葱白

用法：将上药搗烂和灰面炒热，包紮伤处。

又方：

方药：螃蟹

用法：将螃蟹搗烂如泥，包紮伤处。

27、主治：竹木板打伤破皮

方药：黃連　黃柏　黃芩　皮硝　紅花　甘草

用法：将上药研末，火酒調敷。

28、主治：杖疮肿痛

方药：生大黃一两　潮脑五錢

用法：将上药研末，調蜂蜜敷上。

29、主治：抓破臉皮

方药：生姜搗汁　輕粉

用法：将生姜汁調輕粉敷上，好后无疤。

（以上十四方郑氏本、郑盛文献）

（骨折）

骨

1、主治：脱臼　　　　　　　　　　　　　　　　汪黄氏
方药：山姜　麦冬
用法：搥絨包患处

2、主治：正骨　　　　　　　　　　　　　　　　王国圣
方药：水冬瓜　老姜二两　松木炭二两
用法：将諸药搗烂，调匀炒热，如无酒糟，用蜂蜜抹擦皮肤，将药包好，三日一换，如冬天先用桐油擦皮肤，将药包上，五日一换，不論春夏秋冬四季，药干后，用盐水噴上，另用松木皮夹上捆紧。
內服：三七五分至一錢　沒药二錢　凤仙花（即指甲花）如无新鮮的，可用莖和根一錢，煎湯冲酒温服，又如骨折断时，将皮肤穿通，先把出骨复原，留穿孔，用杉木板捆紧后，再敷上提膿生肌膏。

3、主治：接骨断筋　　　　　　　　　　　　　　陆茂恒
方药：凤尾兰（又名順山草）野香菜　龙胆草
制用：将上药搥絨包伤处

4、主治：骨折　　　　　　　　　　　　　　　　陈輝龙
方药：酸米米　韮菜根　烏头　黄栀子
用法：用上药搥絨外包。

內服：乳香二錢　沒药二錢　紅花錢半　生地三錢　当归四錢　苏木五錢　山枝三錢　血竭錢半　土別二錢　然銅二錢　淮夕四錢　羌活三錢　茜草根二錢　碎补三錢　細辛錢半　續断五錢　三七錢半　杜仲四錢　故紙三錢　桂枝二錢

用法：水煎服或泡酒服

5、主治：折伤骨　　　　顾仲培

方药：白蘿蔔一个

制用：搗烂揉出汁，温敷患处，包扎紧，夹好，不久即愈。

6、主治：跌扑伤骨　　　　顾仲培

方药：大虾蟆一个

用法：将上药搗成泥，布包患处，用板夹好，其骨自痊。

7、主治：骨折　　　　顾仲培

方药：破鞋底（要儿童穿土汗的）　飞罗麵

制法：将破鞋底燒灰和麵焙为末，用好醋調成糊状，以布束之，杉木夹好，須臾痛止，骨节有声效。

8、主治：接骨續筋　　　　范机成

方药：苏木炭　柳木炭

用法：用上酒調药摊放白布上包扎伤处。

禁忌：雄鸡、豆腐、牛馬肉等发物。

9、主治：跌打內挫　　　　李中品

方药：海馬二个　生川烏三錢　細辛四錢　白胡椒二錢

用法：将药研細末，每服四分，体弱三分，将药放入酒內，以醉为度。

10、主治：跌打損伤　骨折腰痛　　　　陈德俊

方药：秦艽四錢　紅花四錢　續断三錢　三七一錢　芎

葯三錢　木瓜五錢　乳香三錢　骨碎补五錢　丹皮三錢　血竭三錢　当归五錢　川芎三錢　細辛二錢　党参五錢　杜仲一两　自然銅六錢　元肉五錢　生地五錢　一支蒿五錢

制法：将上葯泡酒三斤

服法：每日早午夜服一次，每次服三錢

11、主治：接骨　　　　曾怒心

方葯：接骨丹（草葯）

制用：用叶搗烂，包扎伤处，即可接骨。

12、主治：接筋接骨

方葯：生旋复花根　麝香少許

制用：将上葯搥絨入麝香包扎伤处

附註：包时多則三天，少則对时即接好，包后以耳听到断骨处响为佳，响后两小时，把葯取下，久則生多骨。

13、主治：接骨　　　　李登邦

方葯：馬蹄細辛　柳枝皮

制用：将上葯搗絨酒炒，包伤处，用柳皮包裹，每日换一次。

禁忌：生冷和刺激性物。

（痈疽）

1、主治：痈疽发背

方葯：当归　草烏　白芷　烏葯　赤芍　只壳　小茴　木通　甘草等一各分

用法：酒水各半煎服

附註：并治脑疽流注，一切肿毒，打伤，疝气，腰痛及

一切痰飲。病在上，食后服，病在下，食前服。

2、方名：拔毒散

主治：已潰未潰无名肿毒

方葯：寒水石三两　生石羔三两　生甘草一两　黄柏三两

用法：上葯研为細末，調鷄蛋清敷患处。

3、方名：鉄箍散

主治：一切肿毒

方葯：大黄二錢　白芷二錢　天花粉二錢　連翹一錢　五棓子二錢　元参二錢　黄柏二錢　黄芩二錢　白芨二錢　白斂二錢　赤芍二錢　紅花二錢　山慈姑三錢　川烏二錢　草烏三錢

用法：上葯研为細末，調蜂蜜敷上，箍散毒消。

4、方名：水石鰾蛸散

主治：久年臁瘡

方葯：寒水石二錢　海鰾蛸二錢　輕粉五分　枯矾五分　陀参八分　龙骨一錢　白芷二錢　干胭脂一張煅存性

用法：将上葯研末，磁瓶收貯。

附註：先用茶或米泔水洗淨处，然后掺上，不宜过多。

5、主治：定痛生肌（有腐肉者用）

方葯：生石羔一两　甘草五錢　月石五錢　辰砂三錢　冰片三分

用法：研末干涂

6、主治：定痛生肌（无腐肉者用）

方葯：熟石羔一两　耳香　血竭各三錢　扫粉五錢　冰片三分

用法：研末干涂

附註：如要生口，用鸡内金泡水加煅龙骨末。痒加枯矾、細茶叶、花椒、食盐煎水洗。

7、方名：捆仙繩

主治：敷疮消肿

方葯：白芨　生半夏　明雄　猩紅等各一分

用法：研末，調鸡蛋清敷。

8、主治：痈疽已潰未潰

方葯：生黃芪四錢　穿山甲二錢　川芎三錢　当归三錢　皂角刺二錢

用法：水煎服

服法：先飲酒一杯，然后服葯。

9、方名：千金內托散

主治：痈疽肿毒

方葯：当归　厚朴　黃芪　官桂　川芎　白芷　防风　干葛　柴胡　連翹　甘草等各一分

用法：水煎八分

服法：空心服

（以上十三方系郑氏本郑盛文献）

（疮类）

1、主治：对口疮　　簡叔平

方葯：抱母鸡屎

用法：趁热敷患处每天换一次以好为度。

2、主治：脾虚火陷的外疮　　李鎮平

方葯：冬青叶　冰片　桐油

用法：先用桐油搽患处，將上葯研末撒上，如痒甚加

枯亿末。

3、主治：貫耳底　提膿生肌　又驅风除湿　　李登邦

方葯：松香一斤　樟脑粉二两　黃丹三錢　豬板油三两

制用：先化豬油　合樟脑　黃丹再煎10至15分鈡即可攤成膏敷患处。

4、主治：一切无名肿毒　　林彪

方葯：八角蓮

用法：先服二三片，后用酒磨搽或敷。

5、主治：巴骨癀　　王銀臣

方葯：雪里箭一两　一扫光一两　五甲西一錢

用法：水煎服一日三次每次半碗

外用大青　芋荷香杆，搗絨外包。

6、主治：疔瘡　　王平洲

方葯：忍冬花五錢　白菊花五錢　卜公英五錢　紫花地丁五錢　紫背天葵子五錢

服法：水煎服　三至五剂

7、主治：疔瘡垂危　　王平洲

方葯：菊花叶（单瓣的）

用法：将菊叶搗烂入酒絞汁飲之，渣敷患处。王平洲

8、主治：疔瘡

方葯：松香二两　沒葯三錢　黃腊一两　銅綠五錢　百草霜五錢　白蜡二錢　桑皮　麻油

制用：提煉成膏为丸，瓶收貯，用时口內温化，不宜火烘，捏扁，貼患处。

9、主治：疔瘡　　王渊泉

方葯：山慈菇

用法：磨酒涂敷。

10、主治：疔疮　　　　　　　　　　　　　　　　　　陈輝龙

方葯：牛背上的蚊子（又名毒蚊）数个

用法：将蚊榨出血，浸在紙上，貼于疮上。

11、主治：黑疔　　　　　　　　　　　　　　　　　辜势超

方葯：白头蚯蚓

用法：将蚯蚓搗烂敷于患处。

12、主治：紅綠疔及对口疮　　　　　　　　　　　　周德純

方葯：野黃菊花

用法：将菊花搗汁服，渣敷患处。

13、主治：疔疮　　　　　　　　　　　　　　　　　楊紹邦

方葯：偷油婆七个　生米飯一勺

用法：搗烂敷患处

禁忌：油糖

14、疔疮紅肿　　　　　　　　　　　　　　　　　　陈德俊

方葯：山慈菇五錢　胡豆連五錢

制用：用上葯搥絨加酒絞汁服，渣敷患处。

禁忌：鸡、魚、发物。

15、方名：荆防敗毒散

主治：疔疮肿痛（幷治乳痛）

方葯：桔梗　甘草　川芎　茯苓　枳壳　前胡　柴胡　羌活　独活　防风　荆芥　連翹　薄荷　銀花等各一分

用法：水煎服。

服法：病在上，食后服，病在下，食前服。

附註：如大便不通，加大黃、芒硝。痛甚加黃連、生姜引。

16、方名：千金救內散

主治：諸疔入腹

方葯：泡参　黄芪　白朮　白芍　白芷　柴胡　連翹

羌活　独活　荆芥　肉桂　姜枣引

用法：水煎服

17、又方：

主治：痈疽并头痛　肚痛　周身痛　內热

方葯：乳香　沒葯　荆芥　連召　銀花　柴胡　黄芪

羌活　独活　甘草　綠豆粉等各一分

用法：水煎，食前服。

18、方名：如意金黄散

主治：諸疮初起

方葯：蒼朮　陈皮　姜黄　花粉　厚朴　南星　黄柏

白芷　大黄　粉草等各一分

用法：将上葯研細，調蜂蜜敷上。

附註：阳症有火，宜用此方，如系阴症，外加干姜，赤芍。如凸起不紅，又加薄荷，上桂，燒酒調敷患处。一二次后，改用麻油調敷即愈。

19、主治：无名肿毒初起

方葯：白矾二两

用法：将白矾溶于水內，用粗紙三張浸湿，貼放疮上，其疮自消。

20、方名：斂疮生肌湯

主治：化膿生肌

方葯：全归三錢　白芍二錢　川芎三錢　元支四錢　云苓三錢　洋参一錢　上桂五分　血茸二錢　化紅一張　貝母三錢　銀花三錢　箭芪三錢　寸冬三

錢　云风三錢　牡味一錢　泽泻二錢　牛夕三錢
車前三錢　水竹叶十片

用法：水煎服。

21主治：烂头疮流黃水

方葯：樟脑一錢　枯矾四分　黃丹一錢　輕粉五分　元粉一錢

用法：将上葯研末，摻上患处。

附註：幷治风眼，火眼，下阴騷痒，出黃水等病。

22、主治：瘰疮（内有膿者）

方葯：夏枯草　馬蹄草　滑头草　野萵苣菜

用法：将上葯口嚼烂或冲烂敷患处。

（以上八方郑氏本、郑盛文献）

23、主治：痈肿发紅　　王平洲

方葯：归尾三錢　赤芍三錢　銀花四錢　黃芩三錢　梔子三錢　土貝四錢　桔梗三錢　乳香（去油）
沒葯（去油）　甘草各二錢

用法：水酒各半煎服。

附註：患在下肢加牛夕三錢，肿大加紫花地丁四錢，妇人乳上生痈加卜公英四錢，如膿已滅，加土炒穿山甲三錢，生黃芪八錢，皂角刺八錢，十五岁以下者，酌减服。

24、主治：瘰疮臭烂　　王平洲

方葯：臭虫　龙骨末

用法：臭虫搗烂和龙骨末調敷患处，出尽黃水即愈。

25、主治：烂脚杆疮，肿，流膿，　　陈玉成

方葯：蕃茄

用法：将紅透生蕃茄破开貼患处数天膿尽愈。

26、主治：脚杆生疮烂出黄水　　方燕宾

方药：鈃（即鉛）

用法：将鈃皮包上第二日痛止，又将鈃火燒化搥薄又包，疮反縮小，儿次即愈。

27、主治：疔疮痒痛　　包兰亭

方药：內服桑菊飲　桑叶一两　菊花二两　甘草一两

服法：水煎服

外用：胡椒末一錢調水外敷

禁忌：烟，酒。

疥疮

28、主治：癞头　　陆茂恒

方药：石灰畜上鉄狠箕

用法：打成粉末，用麻油調敷患处。

29、主治：皮肤肿痒　　李鎮平

方药：木別子二錢　大蜂子二錢　蛇床子二錢　水銀三分　麝香一分　沒药二錢

用法：共研成細末，搓成药撚，熏鼻孔。

30、主治：癞头　　陈德俊

方药：蜈蚣二条　輕粉三錢　雄黃六錢　菜油一杯

制用：将菜油放鍋內煎热，放入上药，調匀，用米泔水熬花椒洗后搽敷

31、主治：癞头　　張耀奎

方药：燙豬毛水

用法：連洗数日痂落即愈。（并可治多年頑癬）。

32、主治：脚丫湿烂

方藥：茶叶

用法：嚼敷之。

33、主治：脚面生疮（不收口者）

方藥：松香　枯矾　杉木燒灰成性各一錢

用法：上葯調麻油敷

34、主治：臁疮

方藥：柿叶燒灰成性，川花椒

用法：上二味研为末，搽患处。

又方：

方藥：桑柏皮一两　輕粉三錢　豬苦胆

用法：将上葯研末調豬苦胆搽。

（以上四方郑氏本、郑盛文献）

（癬）

1、主治：癬

方藥：枯矾　潮脑　等各一分　醋

用法：上葯研为末，調醋搽。

2、又方：

方藥：大蜂子去壳三錢　樟脑五分　水銀一錢　輕粉一錢　核胡肉一錢

用法：上葯共研为末，炼蜜为丸，如黃豆大。将丸一粒放手心連搽五次，其癬自愈。

附註：此葯搽疮和癩均可。

3、又方：

方藥：生半夏　山慈菇　酒

用法：上葯磨酒搽

附註：如有黃水，加皂矾研末搽之。

4、主治：牛皮癬

方葯：黃牛蹄壳煅　蛇皮煅　血余

用法：上葯共研为末，調麻油搽

5、又方：

方葯：巴豆去壳搗細

用法：用手搽患处，但須先以甘草水洗淨。

6、主治：风癬

方葯：防风　荆芥　白芷　苦参　等各一分

用法：煎水洗。

(以上五方郑氏本、郑盛文献)

（瘰癧）

1、主治：瘰癧破烂（內服）

方葯：元参蒸四两　牡蠣醋淬四两　尖貝去心蒸四两

制法：將上葯研細，炼蜜为丸，如录豆大。

用法：每服三錢，开水送下，日服二次。

附註：兼服加味逍遙散：柴胡二錢，茯苓三錢　白朮三錢　白芍二錢　丹皮一錢　炙草八分　山梔二錢　薄荷四錢，不用引。

2、又方（外擦）：

方葯：巴戟一錢　吳萸二錢　慈菇三錢　三稜四錢　莪朮四錢　白芷二錢　白皮三錢　木鱉二个　黃柏二錢　归尾四錢

用法：將上葯研細，調蜜搽。

3、主治：瘰癧（內服）

方葯：指甲花梗皮　白菊花梗皮各四两

服法：泡酒服。

4、又方：

方莂：桔梗二錢　白芷一錢　大力一錢　只壳一錢　云风二錢　赤芍二錢　黄芩一錢　前胡一錢　半夏錢半　录升二錢　姜虫一錢　海藻三錢　昆布一錢　薄荷一錢　甘草节八分　天葵子八分　夏枯草八分

服法：水煎服。

5、主治：瘰瀝結喉下

方莂：燃銅五錢　[illegible]子五錢　斑毛三个　百草霜五錢

制法：上莂研末，麸醋一斤，熬成膏，入莂共熬，以老为佳。

用法：皮紙摊成膏莂，贴患处。外用鷄蛋清敷上。

6、又方（內服）：

方莂：海藻　連召各一两　夏枯草二两　皂角子七个

服法：酒煎，留三日去火，飯后服，每日二次。

7、又方：

方莂：猫骨煅存性研末一分　上冰片一錢

服法：兌酒服。

附註：二三日后，瘰瀝大小全現，四五日，服內消散。

方名：內消散

8、主治：瘰瀝

方莂：知母　貝母　花粉　乳香　半夏　白芨　皂角刺　銀花等各一分

用法：水煎服，服后飲火酒甜酒各一杯。再将莂渣加芙蓉花搗細，敷患处。

（以上八方郑氏本郑盛文献）

9、主治：瘰瀝初期，耳下結核　　顾仲培

方菂：生山菂三两　蓖麻子一两五錢

用法：将上菂搗为泥，温敷患处，日换二三次，以打嚏为度，如敷菂无效，不必敷。

10、主治：瘰癧　　王平洲

方菂：綠萼梅花七朵　鴉蛋一个

制用：将鴉蛋开孔，装入梅花，封口，蒸熟，去花食蛋，每日一个，連服七日，外用元参搗敷。

（梅毒）

1、主治：魚口（內服）

方菂：天麻　生大黃各二錢　土茯苓　金銀花各四錢　姜虫　木通各三錢　虫蜕　防风勾藤各三錢　白芷　升麻各二錢　全虫三个

服法：水煎服。

附註：服上菂后，連服二剂，另加夏枯草煎服。

2、主治：魚口（外包）

方菂：独脚連（宜少用）　生半夏　藤磺　泡参　山海

用法：搗烂包紮。

3、主治：魚口未潰

方菂：陀僧五錢　桐油。

用法：上菂研末，調桐油敷。

附註：外吃全虫七个（瓦焙干、研細）开水和酒吞服。

4、主治：魚口潰烂

方菂：硃砂　辰砂　百草霜各三錢　野菸七匹　麻油

用法：上菂研細，調麻油敷。

附註：并治楊梅疮。

5、主治：包头瘠脛

方药：生地四钱　地丁三钱　車前二钱　土茯苓五钱
泽泻三钱　銀花五钱　白蒺藜四钱　槐花四钱
連召五钱　甘草一钱　酒軍三钱　灯心引
服法：水煎服。

6、主治：玉莖惡疮
方药：芦甘石　乳香　血竭　黃連各一钱　輕粉五分
冰片一分
用法：共研細末，米泔水洗淨后滲上。

7、主治：腊烛花
方药：麝香　乳香　沒药　輕粉等各一分　麻油
用法：将上药共研为末，調麻油敷上。

8、主治：楊梅疮(有痒更宜)
方药：輕粉煅研二钱五分　雄磺煅研二钱五分　杏仁研
細三十个　公豬苦胆
制法：将公豬苦胆調上药敷擦。

9、又方：
方药：虾蟆(活的)一个　六味地黃湯
制法：将上药用沙罐燉服。

10、又方：
方药：元参　桔梗各五分　甘草　大力各三分　紅花一
钱　虫蜕　白芷　归尾　前胡　花粉　厚樸　云
风　豬苓各五分　蜂房七格　車前为引
用法：水煎服。
附註：并治魚口便毒。

11、又方：
方药：防风　秦归各二钱　連翹　赤芍　只壳　半夏
独活　乳香　甘草各一钱　川芎钱半　茯苓三钱

花粉五分　蟬蜕七个　沒葯五分　生地　銀花
苏叶各二錢
服法：水煎服
12、又方：
方葯：金銀花　土茯苓各一两　萆解五錢　何首烏一两
野艾一小把　皂角米二十个　公豬油一斤
服法：燉服。
13、又方：
方葯：土茯苓　穿山甲　防风　羌活　二丑　紫草　銀
花等各一分
服法：水煎服。
14、又方：
方葯：归尾　黃連　蟬蜕　皂角刺各一錢　銀花　連翹
各二錢　赤芍　花粉　茯苓各三錢　羌蚕　芒硝
各五分　大黃一錢　甘草四錢　灯芯引
服法：水煎服。
附註：如不見效，可加蜈蚣（糯米炒）四条同煎。
方名：牛夕湯
15、主治：下疳
方葯：泡参　木瓜　木香　防风　梹榔　貝母　花粉
甘草　牛夕　白朮　黃連　乳香　沒葯等各一分
服法：水煎服
附註：留渣洗患部。
16、又方：
方葯：黃連　連翹　甘草各一錢　豬苓　赤芍　車前各
二錢　川芎三錢

服法：水煎，空心服

禁忌：房事半年。

17、又方：

方葯：儿茶　黄連　輕粉等各一分为末

用法：干搽。

18、主治：魚口

方葯：生白礬　麝香　雄黄　水銀

制法：以上四葯，共研为細末。用紙卷成葯条，以麻油浸湿。

用法：患者坐床上，以被披身上，然后以葯条点燃，熏鼻数次即愈。

19、主治：楊梅疮

方葯：土茯苓二斤　当归　生地　桔梗　金銀花各五錢

制法：先将土茯苓煎至半濃，再将当归等四味投入再煎，以濃为度。

服法：温服，每日二次，数日全愈。

20、又方：

方葯：砂仁五个　五棓子一大个

制法：将砂仁装入五棓子內，以湿紙包燒至焦，研末擦患处。

21、又方：　罗春台

方葯：橄欖核燒灰　冰片　麻油

用法：上葯研末調麻油敷患处。

（以上二十一方郑氏本郑盛文献）

22、主治：先天性梅毒，及傳染性梅毒均效　罗台春

方葯：金銀花　土茯苓　剂量酌用

服法：每日用开水泡葯当茶飲。

禁忌：三日內忌茶酸等。

（痔）

1、主治：痔瘡

方葯：側柏五分　归身二錢半　生地三錢　黃連三錢　枳売二錢半　槐花三錢　地楡三錢　荆芥三錢　川芎三錢半　木通三錢　烏梅三錢　甘草五分

服法：水煎服。

2、主治：痔瘡（止血止痛）

方葯：槐角三錢　槐花三錢　虫蜕三錢　苦参四錢　升麻三錢　地楡三錢　酒軍三錢　生地四錢　側柏叶引

服法：水煎服。

3、主治：內外痔瘡

方葯：蝟皮炙五錢　蛇皮煅五錢　青皮四錢　陈皮五錢　槐实五錢　郁李仁五錢　杏仁三錢　无花果一两　当归五錢　麻仁五錢　麝香三分　炙草四錢

制法：上葯細研炼蜜为丸，如梧桐子大。

服法：每服八九丸，开水送下，不宜多服。

4、主治：痔漏

方葯：金銀花一斤　粉草一斤

制法：將葯一半为末，炼蜜为丸，如梧桐子大。剩葯一半泡黃酒。

服法：每服四五十丸，一日服三次，黃酒送下。

附註：每日外用丸葯一顆，搽痔，能枯落。

5、主治：外痔

方药：团魚背壳

制法：将团魚背壳，用麸醋频搽，用明火煆七次，括下細末。

用法：用口水調搽疮根上，每日七次，多搽亦可。

6、又方：

方药：小海螺一个　清油

用法：将上药煆为細末，清油調搽，其疮自化，数次即愈。

7、主治：痔漏

方药：斑毛三个　紅娘三个　水銀一錢　高香七节，每节四寸

制法：将上药共研为末，用冷飯拌匀，分为七条，每条长二寸，晒干备用。

用法：于每晨将药条一根，燃烌之。烌时口含冷水或肉湯，烌后吐出，不可吞下，并接服下方：

8、接服下方：

方药：元肉　荔枝肉　西枣　皂角米　核桃肉　扫粉等各一分

用法：上药捣烂，共作七丸，每晨服一丸，鸡湯送下。

（以上七方郑氏本郑盛文献）

9、主治：痔疮　刘文明

方药：大黄五錢　党参五錢　菩提子根一两　豬大腸

制用：煎水后药湯燉豬大腸食。

10、主治：一般痔疮　大便干燥　陆玉成

方药：麻油五錢，蜂糖五錢

服法：每日冲开水服。

11、主治：痔疮外用　辜势超

方药：螺蛳肉四两　白糖一两

制用：将螺蛳肉和白糖化出水来，搽于痔上以愈为止。

12、主治：痔疮流血脱肛　　　　　　　　　　　　張耀奎

方药：馬齿莧　重者加熊胆少許

制用：将上药搗烂敷疮上。

13、主治：葡萄痔　　　　　　　　　　　　　　　張耀奎

方药：馬前子一个

制用：将鉗夹定馬前子，放火上燒起烟，燒酒一杯，将燒起烟之馬前子投入酒內，碗罩住，俟烟尽一次吞服。

14、主治：痔核出血　　　　　　　　　　　　　　李世凱

方药：当归六錢　生地炭六錢　木耳三錢　地榆三錢

服法：水煎服。

15、又方：肛門痛　肿脹　　　　　　　　　　　　李世凱

方药：麦冬三錢　大黄錢半　山梔三錢　生地三錢　甘草二錢

服法：水煎服。

16、主治：腸热脱肛　　　　　　　　　　　　　　刘文明

方药：大黄　党参　螺蛳肉　白糖

服法：水煎服(外用冰硼散調麻油涂局部)

(脱肛)

17、主治：脱肛

方药：木別子　桐油

用法：将上药研末，調桐油抹上，卽收。

18、又方：

方药：五棓子三錢　白矾二錢

用法：将上葯熬水洗，卽收。

19、主治：脫肛翻出肿痛

方葯：蟬蜕一两　冰片三分　麝香一分　麻油

用法：将上葯研細調麻油搽。

20、主治：脫肛生虫

方葯：川花椒　枯矾　烏梅　梹榔　川緐子　花粉　三稜　文朮　葱白等各一分

用法：将上葯煎水洗。

附註：洗淨后，敷上前方。

21、主治：脫肛气虚

方葯：大力子叶　豬瘦肉　甜酒

制法：先将大力子叶包好豬瘦肉，剉烂調匀，如李子大。再用大力子叶包好，火灰煨熟。

服法：每服四丸，日服三次，甜酒送下。

（以上五方郑氏本郑盛文献）

22、主治：脫肛久不愈　　蒋远謀

方葯：黑烏稍蛇皮　呂宋果　滑石粉

用法：将呂宋果烤切成片，后用滑石粉合研細末，洒在草紙上，大便后将葯紙墊坐，脫卽收，以后不再发。

禁忌：房事三月。

（湯火）

1、主治：湯火燙伤　　王国圣

方葯：碎骨材叶（土葯）麻油（不用桐油）

用法：将上葯調搽数次卽愈。

2、主治：燙火伤　　陈德俊

方名：水油散

方葯：桐油七錢　水三錢　尿干石（若无改用滑炎粉一錢）

制法：将上葯放入杯内用鸡毛調匀形如豬油可

用法：将葯敷患处，五分鈡一次，每日数十次，用完再制

3、主治：燙火伤　　吳玉清

方葯：綢絲煅成灰　桐油

用法：将上葯調桐油，色复白后，取涂患处。

4、主治：燙火伤　　范机成

方葯：癩蝦蟆十二个　白頸曲鱔一百二十条　楊梅五斤　川黃連五两　黃白皮四两　生大黃半斤　芝麻油三斤六半　窖入土中，对年取用。

制法：将上葯装入壜内埋放土中，封好壜口，次年方用

5、主治：湯火伤　　（郑氏本郑盛文献）

方葯：地榆煅灰，調麻油涂伤用，或用生姜搗汁搽之。

6、又方：

方葯：白矾研細，調冷水洗，其肿自消。

（犬）

1、主治：犬伤　　陈德俊

方葯：桑树砍出自然汁涂之卽愈

2、又方：

方葯：山慈菇　生杏仁　地榆　等各一分

用法：嚼敷伤口

3、又方：

方葯：杏仁　甘草　等一各分
用法：嚼敷伤口，或以杏仁搗敷亦可

4、又方：
方葯：蓖麻子和水搗敷。

5、又方：　　陈德俊
方葯：辣椒粉
用法：酒調敷口当时痛，数日后結痂即愈。

6、主治：惡犬咬伤　　苟习之
方葯：杏仁　紅糖
用法：將上葯搗爛敷患处。

7、又方：惡犬咬伤　　陈德俊
方葯：山慈菇一个
用法：將葯搗烂，敷咬伤处。

8、主治：瘋狗咬伤　　范机承
方葯：韭菜搗汁服
又方：万年青　生地于各一两　黑紫竹根一两
服法：水煎服（外用万年青根叶搥絨敷伤处）

9、主治：瘋犬伤
方葯：紅娘二个　斑猫去头足三个　六甘石一錢　馬前子去毛半个　明雄一錢　糯米一杯同葯炒黃色，將葯擇出，不要糯米，研細酒送下。

10、又方：
方葯：虎骨二錢　化石五錢　紅花五錢　桃仁三十粒
甘草二錢　馬前子二錢
用法：上葯研細，每服五錢，甜酒送下。
禁忌：发物四十天。

（蛇虫咬伤）

1、主治：毒蛇伤　　林彪

方药：臭虫十五个

用法：酒半斤和服。

2、主治：蜂螫伤　吊籮蜂　馬腰蜂等　　林彪

方药：臭虫三个

用法：先用三个开水吞服，再用数个搗烂涂敷。

（外杂）

1、方名：太乙膏

主治：一切疮不收口貼之生肌长肉

方药：香麻油一斤　当归二两　生地二两　甘草一两

制法：上药四味，入油內熬枯，以細絹濾淨去渣，再入鍋內煎至滴水不散，入炒黃丹八两，慢火熬成珠，入黃蜡一两，又入乳香，沒药（去油）各五錢，攪匀，收磁器內，过三日可貼。

2、方名：芙蓉膏

主治：一切疮毒

方药：赤小豆　芙蓉叶

用法：将上药研細，調鸡蛋清敷之。

3、方名：改正鯽魚膏

主治：疮毒

方药：鯽魚十尾　血余一团　龙衣三条　虾蟆二个　陀参一两　沿粉四两　江子一两　萆麻子一两　鏡面草一大把　香油二斤

制法：将上葯熬成膏，貼患处。

4、方名：平安百順白膏

主治：久疮不愈，斂口长肉。

方葯：蓖麻仁一合研末　陈醋一碗　盐一撮

制法：将上葯入鍋內，用槐条攪成膏，先用米泔水洗淨患处，再用鸡毛蘸膏扫上，其皮即皺，其肉即生。

5、方名：水火土三气膏

主治：毒疮

方葯：石灰六两（用碗一个，将石灰放在碗內攪匀，只用水不用石灰）桐油二两　水一盞

制法：将石灰傾入桐油內，用槐条柳枝攪匀，如豬板油色成膏。用生甘草水或米泔水洗淨患处。以鸡毛陸續續扫上。不时又洗又扫。

用法：連洗数次其毒自散。

6、方名：积金膏（改正烏金膏）

主治：去疮腐肉，不伤新肉

方葯：巴豆去壳不拘多少

制法：将巴豆在新瓦上焙成黑色，研細，放在土坑內一日一夜。

用法：将巴豆末掺于患处。

7、方名：生肌膏

主治：多年頑疮

方葯：黃蜡二两　黃丹四两　輕粉　乳香　沒葯（去油）血竭　螵蛸　儿茶各一两　麻油

制法：将上葯研細，入麻油內熬，候滴水成珠，方放入黃蜡，蜡化后，再入黃丹，成膏后，收入罐內。

用法：用布攤貼患处。

8、主治：消腐肉

方药：烏梅不拘多少

制法：将药燒成灰

用法：将烏梅灰滲上患处腐肉自消。

9、主治：膿泡疮

方药：潮脑　吳萸　胡椒　硫磺　菖蒲　花椒　白芷

用法：上药研末，調蜡油搽。

10、主治：足受湿热　足底痛　甚不能步行　动則更痛

方药：用穿上汗的旧草鞋一双，要底未全破者。

制用：泡在尿缸內，三日取出再用火磚一块，燒极热，将泡过尿草鞋放于磚上，候热气上升，再将足放草鞋上，使气蒸之，三次即愈。

11、主治：猴耳胞　　　　蔣远謀

方药：生姜一块

用法：搗汁搽，內服紫金錠。

禁忌：阳性病忌用。

五　官　科

（眼类）

1、主治：火眼　　王国圣
方葯：川連一錢　梅片　雄豬苦胆　枯矾各三錢
用法：用人乳調和好，蒸化点服数次即癒。

2、方名：治眼脹痛方　　刘文明
方葯：杭菊花五錢　党参三錢　白芍三錢　夜明砂二两
用法：蒸豬肝服。

3、主治：夜盲症　　王渊泉
方葯：豬肝四两　百草霜（鍋底煙，要燒柴草火的）适量
用法：用前二味同炒熟，不放油盐，空心服食，連服二三次即癒。

4、又方：治夜盲　　黃昇阳
方葯：鸡肝二付　百草霜三錢
用法：上葯和匀蒸熟，可加少許盐食之，連服三四次有效。

5、又方：治夜盲　　張耀奎
方葯：滿天星草　羊肝
用法：將上葯和羊肝和煮食，有效。

6、主治：紅綫鎖眼　　王平洲
方葯：南枣核二十一枚　銅綠适量
制法：將枣核切为两段，去仁淨，用銅綠塞孔中，仍將核合上，以紙封貼，放鉄瓢內燒紅存性，取放盌

内盖好。

用法：每日用七枚研細末，用乳汁調抹患处，三日愈。

7、方名：撥云散　　　　　　　　　　　　潘炳先

主治：眼朦、眵多

方葯：生地三錢　元参三錢　寸冬三錢　菊花二錢　木賊三錢　虫退二錢　石决明三錢　銀花三錢　連翹三錢　谷精草三錢　甘草一錢　竹叶一錢　灯芯一只。水煎熏眼，后服。

8、方名：治翳子方　　　　　　　　　　　汪黄氏

方葯：狗足跡

用法：取叶貼眼，患右貼左。

9、主治：夜盲症　　　　　　　　　　　　苏明鑑

方葯：豬胆二个取汁　灰面（炒熟）适量

用法：按豬胆汁量，加入熟面調匀，捏成丸子（每丸約0.55公分），成人每服1——2公分，服后两日有效。

10、主治：目生翳障

方葯：荸薺

制法：荸薺去皮搗烂（忌鉄器）将汁絞出阴干，不用渣，研成粉，每一两加冰片一錢。

用法：用銀針点两角。

11、主治：风眼下泪

方葯：冬桑叶　芒硝

用法：将冬桑叶煎水洗，每天二次，或加芒硝少許。

12、主治：目翳

方葯：蜜蒙花一斤（水拌蒸三次）　木賊四两（去节微炒）　羌活八两（蜜水拌蒸）　白蒺藜四两（去

刺焙黄） 石决明四两（焙为末）

用法：上药共研为细末，每服二錢，清茶送下。

13、主治：火眼

方药：豬胆一个 胆矾二分半 枯矾半分

用法：将二味入胆內，阴干为末，点入眼內。

14、主治：云翳

方药：六甘石九次童便浸一分 麝香五厘 黄丹飞淨一分 螵蛸三分煅 硼砂二分 青盐五分 脑片五厘

用法：将上药共研为末，針尖点上。

15、主治：风泪不止

方药：海螵蛸五分 冰片少許 六甘石一錢

用法：上药共研为末，調乳汁点大眼角。

16、主治：两眼不明

方药：熟地二两 茯苓 山药 山萸 丹皮 泽泻 柴胡 五味 当归 杜仲炒 寸冬各一两 枸杞三錢

用法：上药共研为末，炼蜜为丸，盐湯送下。

17、主治：眼目打伤青肿

方药：生半夏磨水調涂

（以上七方系郑氏本，郑盛文献）

（鼻类）

1、方名：治鼻瘤方 陈德俊

方药：狗骨头燒灰 硼沙

用法：将二味和匀，用手指沾唾液蘸药末放入鼻腔內。

2、主治：鼻蟻虫 李中品

方葯：鹿角一錢　枯矾一錢　　血余一錢煅
用法：三味研为細末，先搽少許香油于鼻上，以葯末摻之，內服四物湯。

3、方名：治鼻渊方　　　　　　　　　　　支竹舫
主治：鼻流清涕不止或为膿状，有腥臭。
方葯：辛夷（豬胆汁炒）三錢
用法：水煎服，早晚各服一次。

4、主治：鼻流黃水
方葯：絲瓜連根　酒
用法：将上葯燒灰存性　調酒服

5、主治：蟻虫
方葯：鉄銹
用法：以鉄銹搽患处

6、又方：
方葯：威灵仙二两　青皮
用法：将威灵仙搗細，用青皮包塞鼻孔，每日一換，数日即愈。

7、主治：𧏾虫瘡鼻
方葯：大相枣去核三个　明雄一錢　冰片　麝香各少許
制法：将明雄研細，入枣內，炭火煅尽煙，加冰片　麝香調勻摻上。
附註：先用花椒水洗淨后，再摻上葯。

（以上四方系郑氏本，郑盛文献）

（耳类）

1、主治：化膿性中耳炎　　　　　　　　　李正明
方葯：鴉胆子仁三个　黃連粉三分

用法：二味和匀，褰成紙条，引流，二次全愈。

2、主治：耳出膿不止（便結、紋紫、舌黄）　黄一誠

方葯：秦归二錢　杭芍二錢　金銀花二錢　連翹二錢　穿山甲六分　花粉一錢二分　桔梗一錢三分　皂角刺四分　梔仁錢半　粉草一錢二分

用法：水煎服。

附註：此系小儿量，成人可酌加。

3、主治：中耳炎　王国圣

方葯：田螺螄壳三个　枯矾八分　梅片五分

制法：田螺螄壳研細末，入枯矾梅片共研极細。

用法：用葯棉洗淨耳內，将上葯末点入，三次即愈。

4、主治：灌耳心　王云臣

方葯：一扫光（草葯）腊肉

用法：将上葯炒腊肉，炒后去葯吃肉。

用量：三至五岁，用一扫光五錢，八至十三岁用一两。

5、又方：治久灌耳心（半年至一年者）　王云臣

方葯：雪里箭一两　泡参一两　一扫光五錢

用法：熬水服，一日三次，每次半碗。

6、主治：耳炎（干痛或耳唐）　辜勢超

方葯：石蓮花取汁用　核桃油

用法：用石蓮叶挤出的水和核桃油調匀，滴入二、三滴，数次即愈。

7、主治：耳聾气閉　陈德梭

方葯：小种蒼蒲　小黄草各二錢

用法：将上葯熬甜酒服。

8、方名：耳聾方　周德純

主治：患大燒热病后，耳聾者。

方药：响铃草二至三两

用法：将上药煨猪耳朵服，有特效。

9、主治：耳痛流膿

方药：桑螵蛸一个　麝香五厘

制法：桑螵蛸燒灰存性研末，入麝香調匀。

用法：先将耳內洗淨，然后搽上。

10、主治：耳內流水

方药：香附末

用法：将耳洗淨后，以上药搽之。

附註：如出血，以龙骨研細吹入。

11、主治：耳忽聾閉

方药：草麻子百粒　大枣去核十五枚

用法：上二味搗烂，入男胎乳汁和作錠，如枣核大，以綢裹塞耳，以热为度，一日一换。

12、又方：活鼠破之出胆，滴入耳內，能治多年耳聾。

13、主治：耳閉

方药：細辛　石菖蒲　木通各一錢　麝香二厘

用法：將上药共研为末，以棉裹塞耳內。

14、主治：耳閉作痛

方药：田螺一个　麝香五分

用法：将田螺撥开盖，放入麝香，自化成水，滴入耳內。

15、主治：耳內出膿

方药：五棓子末

用法：用竹筒吹入耳內。

16、主治：耳內流濃肿痛

方药：番木别一个

用法：磨水滴耳內

17、又方：以熟石羔研末，竹筒吹入耳內。

18、又方：

方葯：海螵蛸研一錢　枯矾一錢　麝香一分　千胭脂燒存性五分

用法：将上葯研末，吹入耳內。

19、主治：潰耳心

方葯：龙骨　象皮　胭脂　黃丹　儿茶　血蝎各三錢　枯矾二錢　麝香一分

用法：上葯共研为末，吹入耳內。

20、主治：陀僧　硫磺　明雄　枯矾各二錢　龐

用法：将上葯共研为末，調龐油搽。

忌：发物。

21、又方：

方葯：血余瓦焙灰存性　冰片

用法：血余一錢，加冰片七厘調匀，吹入耳內。

22、又方：以胡豆叶搗汁　滴入耳內

23、方名：吹耳散

方葯：黃丹　輕粉各三分　雄精一分　冰片　麝香各五厘

用法：上葯共研为末，吹耳用。

附註：出痘后，目生翳，左眼吹左耳，右眼吹右耳。

（以上十二方系郑氏本，郑盛文献）

（口瘡）

唇、口、舌。

1、主治：口疮

方药：炙黄柏

用法：研末干涂

2、又方：

方药：儿茶

用法：口中噙化即愈。

3、主治：口蛾

方药：莧菜梗

用法：燒灰涂上即愈

4、主治：口上疔疮

方药：銀硃　荔枝肉各三錢

用法：上药共搗拌，敷患处。

5、主治：羊胡子

方药：水边楊柳树細根　麻油

用法：上药焙干研細　調麻油搽。

6、主治：舌上生疮

方药：黄柏八錢　黃連五分　儿茶一分

用法：上药共研为末，涂患处。

7、主治：舌上出血

方药：雄鸡冠血

用法：将血浸嚥下。

8、主治：舌肿

方药：麻黃研末

用法：掺上立愈

9、主治：口痛

方药：陈艾七片　虫蜕二个　銀花　苏荷　北辛　陈皮

枳壳　大黃各七錢

用法：煎水洗口。

10、主治：唇干出血

方药：桃仁　豬油

用法：上药搗烂，調豬油敷上。

11、主治：唇烈生疮

方药：瓦松　生姜

用法：上二味加盐少許，搗涂唇上。

（以上十一方系郑氏木，郑盛文献）

12、主治：舌条肿大　宋元明

方药：巴豆三顆搗碎

用法：将上药和面捏为小餅，包貼眉心上端，待起紅泡去餅，用針放出黃水卽愈。

13、方名：治歪咀方　顾仲培

主治：夜睡晨起，忽覺咀歪。

方药：黃鱔血

用法：将黃鱔一条，用手掐断鱔尾，血出，卽以涂搽患处。（搽凸面、不搽凹面，每日数次不等）另用金耳环扯着綫套耳上，将环鉤住口角，二三日卽复原状。

（牙类）

1、主治：牙痛　李登邦

方药：黃瓜叶

用法：将上药搗取汁，用棉花蘸敷患处。

2、主治：火牙痛方　范机承

方药：生地八錢　錦紋大黃三錢　石羔三錢

用法：水煎服，三次卽愈。

3、主治：虫牙痛方　　　　　　　　　　　　范机承

方药：复盆子嫩叶

用法：将上药生捣取汁，点入眼内，虫即随泪流出，儿次即断根。

4、主治：风牙痛方　　　　　　　　　　　　范机承

方药：荆芥三錢半　防风三錢半　盐梅五顆　五棓子三錢　樟脑三厘

用法：水煎服即愈。

5、主治：血牙疳　　　　　　　　　　　　　李登邦

方药：泡木花　死鷟霜

用法：二味等分研末，用草筒吹放患处。

6、方名：治牙齧方　　　　　　　　　　　　封藻华

主治：小儿痧后，牙齧动脱。

方药：絲渣五分（燒）　鲫魚一尾　砒霜五分

用法：将絲渣、砒霜共入鲫魚肚内，煅存性为末，放二次即愈。

7、方名：固齿方　　　　　　　　　　　　　頋仲培

方药：食盐不拘多少　苦竹筒一截（約四五寸长）

制法：将食盐末装入苦竹筒内，紙团塞紧筒口，炭火内燒成炭，取出盐研細末听用。

用法：每晨用盐擦牙代牙粉，可保老年齿固少生齿病，亦可治风、火、虫牙。应少吃糖及燥火物。

8、主治：牙痛

方药：綠升麻三錢　綠豆一合

用法：上二味燉肉吃。

9、主治：风火虫牙痛

方药：花椒　蜂窩　白矾

用法：上三药搗烂，泡燒酒🈹。

10、主治：走馬牙疳

方药：人中白煅淨二两　儿茶一两　黃柏　薄荷　青黛各六錢　冰片五分

用法：上药共研末，先以溫水漱口，然后吹药于患处。

（以上三方系郑氏本，郑盛文献）

（咽喉）

1、方名：治白喉方　　封藻华

方药：人中白（即尿垢）炕干研末

用法：将竹笔筒吹入，一二次即愈。

2、主治：白喉症　　顾仲培

方药：青果二錢　儿茶二錢　光貝錢半　薄荷二錢　黃柏二錢　冰片三分　凤凰衣三錢

用法：将上药共研細末，取草管吹放患处，內服养阴清肺湯。

3、方名：治喉閉方　　顾仲培

主治：白喉及单双鵝喉閉

方药：紅牛膝（即土牛膝紅色者，俗名紅牛髂膝）

用法：将上药搗烂，用淨布包好，含在口內🈹，将药汁緩緩咽下，或先吐出涎沫，再为咽下，多🈹数次即愈。

4、方名：治单喉鵝方　　凌云标

主治：一切喉肿均效

方药：手鐲虫，泡燒酒一周以上。

用法：先用药酒搽頸外痛处，再內服一小酒杯，患处頃刻爆破頓覚松快。

5、主治：喉閉等症　　楊巨源

方葯：偷油婆一至二个

用法：泡水服。

6、主治：喉痛　　李登邦

方葯：露水竹叶菜（又名鴉舌头）

用法：将上葯搗烂，含一夜即愈。

7、主治：喉痛症　　周德純

方葯：牙皂研細末

用法：上葯用醋調，攤油紙上，貼在喉部外面，布带扎定，反应皮肤发痒。

禁忌：干燥物品。

8、主治：咽喉音夏（凡风邪襲肺咳久失音可治）支竹舫

方葯：蟬衣五分　玉蝴蝶五分　胖大海二錢　冰糖五錢

用法：水煎服，重則三服音即响亮。

9、主治：魚骨哽喉　　支竹舫

方葯：橄欖核四枚，燒灰研細末。

用法：将前葯用开水送下，即消失。

10、方名：治喉症方（熨法）　　張　琼

主治：喉中出現紅子子，二三日不能吃下食物，葯不能治者。

治法：用舂盐棒（石头的）在火上烤热燙熨耳根下（用布包着燙）左右輪燙二小时即愈。

11、主治：失語症（針灸）　　張印仁

穴位：金津玉液（三稜針出血）神門　合谷　少商

附註：失語半年，經施治后，当时即能說話。

12、主治：顏面神經麻痺（口眼歪斜）　　張印仁

穴位：地仓　頰車（針灸并用）另配合谷針刺（重用兴

奋法）

附註：連治10次痊愈。

13、主治：鵝子

方葯：偷油婆七个　花蜘蛛七个　硼沙二錢

用法：上葯瓦上焙干研細吹入即愈。

14、又方：

方葯：土牛夕連根帶土　醋

用法：上葯搗烂調醋噙口中。

15、又方：

方葯：人指甲

用法：将人指甲焙焦研細，用竹管吹入喉内。

16、又方：

方葯：胆矾　雄黃　青胆

用法：上葯研末吹喉。

17、又方：

方葯：葫芦一个

用法：将葫芦尿桶内泡一月，取出吊干燒灰，用棉花裹灰搽上，其鵝自破。

18、主治：喉痺失音

方葯：瓜蒌皮　白僵蚕炒　甘草炒各二錢

用法：将上葯共研为末，每服三錢，姜湯送下。

19、主治：喉内火毒

方葯：人中白煅一錢　硼沙五分　胆矾二分　冰片五厘

用法：上葯共研为細末，吹患处。

附註：并治喉风、单双鵝及小儿患疮。

方名：吹喉散

20、主治：咽喉各种病症

方葯：石青　青黛　硃砂　硼砂各一錢　胆矾　人中白

牙硝　冰片　山豆根　明粉各五錢　麝香三分

用法：上葯共研为末，收入瓶內，用时以二三厘吹入喉內。

（以上九方系郑氏本，郑磐文献）

［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝安顺市中医、民间医、民族医秘方验方　　第一集
作者＝安顺市卫生科
页数＝１３６
ＳＳ号＝１１４０１１６２
出版日期＝１９５９年０９月

书名
前言
内科
１、风温感冒………………１１方
２、中风……………………　　５方
３、癫痫……………………　　４方
４、头痛、眩、晕…………　　５方
５、咳嗽、哮喘……………１２方
６、血症（咳、吐、衄、便尿）３８方
７、汗症………………　　６方
８、虚劳……………………　　４方
９、黄疸…………………　　２方
１０、肿胀…………………１７方
１１、心胃痛………………１５方
１２、胸胁痛………………　　６方
１３、腹痛…………………　　８方
１４、吐泻…………………１５方
１５、疟疾………………１６方
１６、痢疾…………………１３方
１７、风湿瘫痪痿…………２１方
１８、前阴………………１２方
１９、小便…………………　　９方
２０、遗精…………………　　７方
２１、五淋…………………１９方
２２、疝气………………２０方
２３、麻风………………５方
２４、杂症………………１０方
妇科（９０方）
１、妇经……　……１６方
２、种子　…………　３方
３、崩带……………６方
４、胎产………………２３方
５、乳疾……………２７方
６、杂病……………………１６方
儿科（８７方）
１、麻疹………………１１方
２、惊痫………………１９方
３、百日咳……………４方
４、喘咳………………　　６方

5、疳积……………………8方
6、浮痢……………………１２方
7、脱肛………………………3方
8、虫症……………………6方
9、杂病……………………１８方
外科（２１０方）
1、刀伤……………………３４方
2、跌打损伤………………２９方
3、骨折……………………１５方
4、痈疽……………………9方
5、疮类……………………４０方
6、瘰疬……………１０方
7、梅毒…………………２２方
8、痔、脱肛………………２２方
9、汤火……………6方
１０、犬、蛇、虫伤………１２方
１１、外杂……………１１方
五官科（８９方）
1、眼类……………………１６方
2、鼻类……………　7方
3、耳类…………………２３方
4、口疮……………………１３方
5、牙类……………………１０方
6、咽喉…………………２０方